

Chemie.

Halogenosalzbildung
bei aromatischen
Arsen- und Antimonverbindungen.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
genehmigt von der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Bonn.

Von
Paul Schmidt
aus Düsseldorf.

Bonn 1936
Anton Brand, Bonn.

Berichterstatter:

Prof. Dr. Dr. ing. E. h. Paul Pfeiffer.



Meinen Eltern!

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Dr. ing. E. h.
Paul Pfeiffer möchte ich an dieser Stelle meinen aufrichtigen
Dank aussprechen für seine wertvollen Ratschläge und die Unter-
stützung, die er mir zuteil werden ließ.

Überblick.

Einleitung.

Verfuchsteil:

I. Aromatische Antimonverbindungen ¹⁾

A. mit 3-wertigem Antimon:

1. Pyridinium-(m-chlorphenylo-trichloro-stibiat)
2. Chinolinium-(m-chlorphenylo-trichloro-stibiat)
3. Pyridinium-(α -naphtylo-trichloro-stibiat)
4. Versuch zur Darstellung von Chinolinium-(α -naphtylo-trichloro-stibiat)
5. Pyridinium-(β -naphtylo-trichloro-stibiat)
6. Versuch zur Darstellung von Pyridinium-(diphenylo-dichloro-stibiat)
7. Versuch zur Darstellung von Pyridinium-(triphenylo-chloro-stibiat)

B. mit 5-wertigem Antimon:

8. Pyridinium-(phenylo-pentachloro-stibanat)
9. m-Chlorphenylstibonfäure
10. Pyridinium-(m-chlorphenylo-pentachloro-stibanat)
11. Chinolinium-(m-chlorphenylo-pentachloro-stibanat)
12. α -Naphtylstibonfäure
13. Pyridinium-(α -naphtylo-pentachloro-stibanat)
14. Chinolinium-(α -naphtylo-pentachloro-stibanat)
15. β -Naphtylstibonfäure
16. Pyridinium-(β -naphtylo-pentachloro-stibanat)
17. Chinolinium-(β -naphtylo-pentachloro-stibanat)
18. Pyridinium-(β -naphtylo-pentabromo-stibanat)
19. Pyridinium-(diphenylo-tetrachloro-stibanat)
20. Versuch zur Darstellung von Pyridinium-(triphenylo-trichloro-stibanat)

¹⁾ Es wurde zur Bezeichnung der Antimonkomplexsalze die Nomenklatur von A. Werner verwandt. (Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der anorganischen Chemie.)

II. Aromatische Arsenverbindungen:

21. p-Dimethylaminophenyl-arsinoxyd
 22. p-Arsenosphenyl-trimethyl-ammoniumjodid
 23. Versuch zur Darstellung eines Chlorofalzes des p-Dimethylaminophenyl-arsen(3)chlorids
 24. Tris-(p-dimethylaminophenyl)-arsinperchlorat
 25. Versuch zur Darstellung eines Chlorofalzes des p-Aminophenyl-arsen(5)chlorids
 26. Versuch zur Darstellung eines Chlorofalzes des Phenylarsen(5)chlorids
 27. Versuch zur Darstellung eines Chlorofalzes des Triphenylarsins.
 28. Versuch zur Darstellung eines Chlorofalzes des α -Naphthyl-arsen(3)chlorids
 29. Arsonsäure von H. Schmidt.
-

Einleitung


Die Bildung von Halogenofalzen aus Halogeniden erfolgt nach der Koordinationstheorie von A. Werner¹⁾ in der Weise, daß die Halogenatome des einen Halogenids sich koordinativ an das Metallatom des anderen Halogenids anlagern. Dabei wird das negativere Metallatom zum Koordinationszentrum. Aus diesem Grunde fungieren in erster Linie Schwermetalle und Metalloide als Zentralatome in den komplexen Anlagerungsverbindungen, während das Kation vorzüglich durch Alkalimetalle, unter anderem auch durch Ammonium²⁾ und seine Derivate wie Pyridinium²⁾ und Chinolinium²⁾, vertreten ist. Die Anzahl der maximal in die 1. Sphäre einföhrbaren Halogenatome bzw. anlagerfähigen Moleküle richtet sich nach der Koordinationszahl des Zentralatoms. Die Konstanz der Koordinationszahl eines Zentralatoms in analog gebauten Verbindungen zu erweisen, ist ein Teil der Aufgabe der vorliegenden Arbeit, in der versucht wird, Anlagerungsverbindungen von salzsr. Pyridin bzw. Chinolin an aromatische Antimon- und Arsenhalogenide darzustellen. Gleichzeitig soll die Arbeit einen Beitrag zur Theorie der Halogenofalze geben.

Die Bildungsfähigkeit von Halogenofalzen ist unter anderem abhängig von der Natur des Halogenatoms; sie nimmt in der Reihenfolge J — Br — Cl — F zu, d. h. je stärker der negative Charakter des Halogens ist, desto leichter erfolgt die Bildung von komplexen Anlagerungsverbindungen. Umgekehrt ist zu erwarten, daß bei schrittweisem Ersatz der Halogenatome in einem Halogenofalze durch organische Radikale die Bildungsmöglichkeit für eine Molekülverbindung abnehmen muß. Diese Tatsache kommt deutlich in einer Arbeit von P. Pfeiffer über Chlorostanneate²⁾

1) A. Werner, Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der anorganischen Chemie, Auflage V, S. 90 ff.

2) A. 376, 310—344.

zum Ausdruck; so gelang es Pfeiffer unter anderem folgende Chlorofalze darzustellen ³⁾:



Auch die entsprechenden Bromofalze konnten erhalten werden. Die 1. Übergangsreihe zeigt, daß im Chlorostanneat maximal 2 Chloratome der 1. Sphäre durch das Methylradikal ersetzt werden können. Beim Versuch, das 3. Chloratom zu ersetzen, konnte keine Anlagerungsverbindung mehr gefaßt werden. Wird nun in dem Chlorostanneat systematisch das Chlor in der 1. Sphäre durch den Phenylrest ersetzt, wie in der II. Übergangsreihe wiedergegeben wird, so ist wegen der negativeren Natur des Phenylrestes ein Triphenylo-trichloro-stanneat noch existenzfähig, dagegen gelang die Darstellung eines Tetraphenylo-dichloro-stanneats nicht mehr.

In der vorliegenden Arbeit werden nun aromatische Chlorofalze des 3- und 5-wertigen **Antimons** beschrieben; entsprechende Verbindungen des **Arfens** scheinen nicht zu existieren; jedenfalls waren alle Versuche solche zu erhalten, ergebnislos. Die Ausgangsverbindungen unserer Doppelhalogenide, die aromatischen **Stibon-fäuren**, sind nach der Methode von H. Schmidt relativ leicht zugänglich. Schmidt untersuchte sie in einem anderen Zusammenhange. ⁴⁾

Bekanntlich leiten sich von den beiden Chloriden des Antimons



und




durch Anlagerung von einem Molekül Salzsäure 2 hypothetische Chlorofäuren mit den Koordinationszahlen 4 bzw. 6 ab:

3) Me = H. Pyridin bzw. H. Chinolin, abgekürzt geschrieben H. Py und H. Ch.

4) A. 421, 177.


diazotierten α -Naphtylamins vor den weiteren Umfätzen mit Tierkohle vollständig entfärbt und wird weiterhin darauf geachtet, daß die Fällung des Diazoniumdoppelsalzes mit einer klaren, falzsr. Lösung von Antimontrichlorid in **stark falzsr.** Lösung geschieht, so wird ein schwachgelbes, gut kristallisiertes Doppelsalz erhalten, dessen Analyse auf die Formel



stimmt.

Die Ausbeute ist sehr gut. W. Riddell und St. Basterfield¹²⁾, sowie F. F. Blicke und U. O. Oakdale¹³⁾ machen über diese Zwischensubstanz bei der Darstellung der α -Naphtylstibonsäure überhaupt keine näheren Angaben.


Das β -Naphtyldiazoniumdoppelsalz ist von May¹⁴⁾ ebenfalls nur in unreiner Form erhalten worden. Bei sauberem Arbeiten (Reinigen mit Tierkohle usw.) wird ein gelbes, gut kristallisiertes Salz von der Formel



erhalten.

Die Ausbeute ist wiederum sehr gut. Von M. E. Brinnand und seinen Mitarbeitern¹⁵⁾ wird bei der Beschreibung und Darstellung der β -Naphtylstibonsäure die Diazoniumanlagerungsverbindung nicht erwähnt.

Ein weiteres Doppelsalz dieser Reihe ist das m-Chlorbenzoldiazoniumdoppelsalz



dessen Darstellung im Versuchsteil näher beschrieben wird.

12) Trans. Roy. Soc. Canada 1929, III, 45—52.

13) J. Amer. Chem. Soc. 55, 1198—1201.

14) J. Chem. Soc. London, 101, 1039 (1912).

15) Ebenda 1932, 1815—1819.

Im Gegensatz zu den Literaturangaben sind diese Chlorofalze gut kristallisiert und sehr beständig; sie halten sich wochenlang, wenn sie trocken aufbewahrt werden. Sie haben meistens charakteristische Schmelzpunkte. In der offenen Flamme verpuffen sie. Durch Wasser werden sie langsam zersetzt; mit Alkalien setzen sie sich unter Stickstoffentwicklung zu Arylstibon Säuren um.¹⁶⁾ In konz. Salzsäure sind sie unlöslich. Die Isolierung der Diazoniumdoppelfalze als Zwischenprodukte bei der Darstellung der Arylstibon Säuren hat den Vorteil, daß mit geringeren Flüssigkeitsmengen gearbeitet werden kann und bei der Zersetzung mit Alkali eine reine Verbindung vorliegt. Zur Darstellung der in dieser Arbeit erwähnten Arylstibon Säuren wurden daher immer erst die Diazoniumdoppelfalze isoliert.

Die Zersetzung der Aryldiazoniumkomplexfalze mit verd. Alkalien zu den Stibon Säuren erfolgt bei den einzelnen Arylderivaten unterschiedlich. Bei Benzolderivaten ist die Ausbeute durchgängig bei kurzer Zersetzungsdauer gut. In der Naphtalinreihe dagegen ist die Ausbeute selbst nach mehrtägigem Behandeln mit verd. Alkalien sehr schlecht.

So wurde die α -Naphtylstibon Säure von uns in einer Ausbeute von 4 g statt theor. 200 g erhalten. W. Riddell und St. Basterfield¹⁷⁾ sowie F. F. Blicke und U. O. Oakdale¹⁸⁾ geben bei ihrer Darstellung weder Arbeitsmethode noch Ausbeute noch Zwischenkörper an. Es wurden daher in dieser Arbeit systematische Versuche zur Zersetzung des α -Naphtyldiazoniumdoppelfalzes durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, daß 10%iges Alkali in 8-tägiger Versuchsdauer unter dauerndem Rühren die maximale Ausbeute von 2% an α -Naphtylstibon Säure lieferte.

Auch die β -Naphtylstibon Säure, die erstmals von M. E. Brinnan und seinen Mitarbeitern¹⁹⁾ ohne Angaben über die Ausbeute dargestellt wurde, konnte nur in geringen Mengen isoliert

16) H. Schmidt, A. 421, 177 (1920).

17) Trans. Roy. Soc. Canada, 1929, III, 45—52.

18) J. Amer. Chem. Soc. 55, 1198—1201.

19) J. Chem. Soc. London 1932, 1815—1819.

werden. Systematische Versuche, das β -Naphtyldiazoniumdoppelsalz mit Wasser, 20%iger Soda, 2 n Alkali, 2 n wässrigem Ammoniak, 20%igem und 40%igem Alkali in der Kälte oder in der Wärme zu zersetzen, waren erfolglos. Mit 10%igem Alkali gelang es nach acht-tägigem Zersetzen unter fortgesetztem Rühren eine maximale Ausbeute von 3 g statt 200 g theor. zu erzielen. Das Hauptzersetzungsprodukt war ein rotbraunes Pulver, das im Unterschied zur β -Naphtylstibon säure in 10%igem Alkali unlöslich war und das neben Farbstoffen, die man mit Aceton ausziehen konnte, vorwiegend anorganische Antimonverbindungen enthielt, wie eine Probe mit Schwefelwasserstoff zeigte.

Zum ersten Male wurde auf diesem Wege die m-Chlorphenylstibon säure hergestellt, die in sehr guter Ausbeute erhalten wurde. Ein grundsätzlich anderes Verfahren erwähnen H. Schmidt und Fr. Hoffmann²⁰⁾, die von m-Chlorbenzoldiazoniumfluorid, das als komplexe Anlagerungsverbindung an Borfluorid vorliegt, ausgehen und durch Umsatz mit Antimontrichlorid zu der May'schen Substanz gelangen, die dann mit Pyridin zu der gewünschten Stibon säure zersetzt wird.

Ganz allgemein werden aus den alkalischen Lösungen der zer-setzten Diazoniumdoppelsalze durch Ansäuern zunächst die rohen, durch Nebenprodukte gefärbten Arylstibon säuren gewonnen, die dann über die entsprechenden Chlorosalze gereinigt werden.²¹⁾

Wird in dem komplexen Chlorosalz $(\text{SbCl}_6) \cdot \text{NH}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ²²⁾ ein Chloratom durch einen Arylrest ersetzt, so kommt man zu dem **Ammonium-(arylo-pentachloro-stibanat)** von der allgemeinen Formel



Diese Komplexsalze werden durch Versetzen einer konz. salzsr. Lösung der Arylstibon säuren mit einer kaltgesättigten, salzsr. Lösung von Ammoniumchlorid erhalten. Bekannt sind bis jetzt nur

20) D.R.P. 493 690, C. 1930, I, 3485.


21) H. Schmidt, A. 421, 186.

22) Weinland und Schmid, Z. anorg. Chem. 44, 37.


Ammoniumsalze des 5-wertigen Antimons. Da die aromatischen Ammoniumchlorostibane in konz. Salzsäure durchgängig schwerer löslich sind als das Ammoniumhexachlorostibanat $(\text{SbCl}_6) \cdot \text{NH}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, so lassen sich mit ihrer Hilfe bequem die Arylstibonsäuren von den beigemengten anorganischen Antimonverbindungen trennen.²³⁾

Alle aromatischen Antimonverbindungen haben die charakteristische Eigenschaft, in Eisessig oder konz. Salzsäure gelöst, beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen farblosen bis schwachgelben Niederschlag von aromatischen Antimonulfiden zu geben; dadurch unterscheiden sie sich ganz wesentlich von den anorganischen Antimonverbindungen.




H. Schmidt²⁴⁾ beschreibt unter anderem folgende Ammoniumsalze der aromatischen Reihe:



NO_2



Von uns wurden in der vorliegenden Arbeit als neue Verbindungen von diesem Typ erhalten:



23) H. Schmidt, A. 421, 186.

24) A. 421, 201—208.


Bei den einfachen Benzolderivaten sind die Ausbeuten an den Doppelchloriden sehr gut. In der Naphtalinreihe lassen die Ausbeuten sehr zu wünschen übrig; manchmal erfolgen die Chlorofalzfüllungen erst nach mehreren Stunden.

Chlorostibianate des Typus $((\text{Ar})_2 : \text{SbCl}_4) \cdot \text{NH}_4$ mit 2 Arylresten im Kern haben sich bisher nicht darstellen lassen. Die Bildung von aromatisch substituierten Chlorofalzen mit Ammonium als positivem Radikal scheint also auf Monoaryloverbindungen beschränkt zu sein.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die bisher bekannten Arylostibiate und Arylostibianate des Ammoniums; hinzugefügt sind auch die Formeln der Salze, deren Darstellung nicht gelang.

Stibiate		Stibianate	
$(\text{SbCl}_4) \cdot \text{NH}_4$ ²⁵⁾	+	$(\text{SbCl}_6) \cdot \text{NH}_4$	+
$(\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{SbCl}_3) \cdot \text{NH}_4$	—	$(\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{SbCl}_5) \cdot \text{NH}_4$	+
$((\alpha)\text{C}_{10}\text{H}_7 \cdot \text{SbCl}_3) \cdot \text{NH}_4$	—	$((\alpha)\text{C}_{10}\text{H}_7 \cdot \text{SbCl}_5) \cdot \text{NH}_4$	+
$((\beta)\text{C}_{10}\text{H}_7 \cdot \text{SbCl}_3) \cdot \text{NH}_4$	—	$((\beta)\text{C}_{10}\text{H}_7 \cdot \text{SbCl}_5) \cdot \text{NH}_4$	+
$((\text{C}_6\text{H}_5)_2 : \text{SbCl}_2) \cdot \text{NH}_4$	—	$((\text{C}_6\text{H}_5)_2 : \text{SbCl}_4) \cdot \text{NH}_4$	—

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde die Bildung von Chlorostibiaten und Chlorostibianaten, die als Kation Pyridinium bzw. Chinolinium besitzen, untersucht. Bekanntlich leiten sich die **Chlorostibiate** von der hypothetischen Chlorosäure







ab. Die Pyridinium- bzw. Chinoliniumsalze dieser Säure sind kürzlich durch P. Pfeiffer und K. Schneider bekannt geworden: ²⁶⁾





In der gleichen Arbeit beschreiben P. Pfeiffer und K. Schneider auch einige Monoarylo-trichlorostibiate ²⁶⁾, die sich von den genannten Chlorofalzen derart ableiten, daß ein Chloratom durch einen Arylrest ersetzt ist:

25) Deherain, Jahresber. d. Chem. 1861, 150.


26) B. 68, 54.




Auch mir gelang es, einige neue Verbindungen dieser Klasse darzustellen, so das Pyridinium- und Chinolinium-(m-chlorphenyl-trichloro-ftibiat



das Pyridinium-(α -naphtylo-trichloro-ftibiat)



und das Pyridinium-(β -naphtylo-trichloro-ftibiat)



Das Chinolinium-(α -naphtylo-trichloro-ftibiat) wurde nicht erhalten. Von der Gewinnung der entsprechenden β -Naphtylverbindung mußte Abstand genommen werden, da nicht genügend Ausgangsmaterial zur Verfügung stand. Im allgemeinen verfährt man zur Darstellung der Arylochloroftibiate die salzsr. oder Eiseffiglösung der Arylftibinoxide mit einer salzsauren Lösung von Pyridin bzw. Chinolin, wobei man für möglichst große Konzentration der Komponenten forgt. Unter Umständen scheiden sich die Doppelsalze erst nach mehreren Tagen im Vakuum über Natronkalk aus. Am leichtesten kristallisieren die Phenylsalze und die Salze mit substituierten Phenylresten; auch sind diese am stabilsten. Die Einführung des Naphtylrestes in die Chloroftibiate vermindert jedoch

sehr stark die Beständigkeit der Salze; auch ist die Ausbeute an ihnen recht gering.

Ergeben sich schon bei den Monoarylotrichlorostibiaten Schwierigkeiten bei der Darstellung, so waren die nächsten Versuche, Dichlorodiarylostibiate zu gewinnen, ohne jeden Erfolg. Als Ausgangsverbindung zur Darstellung eines Pyridinium-(diphenyldichlorostibiat) diente das von H. Schmidt her bekannte²⁷⁾ und von mir nach einer neuen Methode gewonnene Diphenylstibinoxyd. Es konnte aber weder ein Chinolinium- noch ein Pyridiniumdoppelsalz erhalten werden. Daß die Versuche, eine Anlagerungsverbindung von Triphenylstibin²⁸⁾ an salzsr. Pyridin bzw. Chinolin darzustellen, vergeblich waren, ist nach alledem wohl selbstverständlich.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die bisher bekannten Arylostibiate des Pyridiniums und Chinoliniums; es sind auch die Formeln der Salze aufgeführt, deren Darstellung nicht gelang.

	H. Py	H. Ch
$(\text{SbCl}_4)^+$	+	+
$(\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{SbCl}_3)^+$	+	+
$((\beta)\text{C}_{10}\text{H}_7 \cdot \text{SbCl}_3)^+$	+	?
$((\alpha)\text{C}_{10}\text{H}_7 \cdot \text{SbCl}_3)^+$	+	—
$((\text{C}_6\text{H}_5)_2 \text{ SbCl}_2)^+$	—	—
$((\text{C}_6\text{H}_5)_3 \text{ SbCl})^+$	—	—

Weiterhin wurden die **Pyridinium- und Chinolinium-(arylochlorostibanate)** untersucht, von denen zunächst die Monoarylopentachlorostibanate besprochen seien. Sie besitzen die allgemeine Zusammenfassung



P. Pfeiffer und K. Schneider²⁹⁾ haben unter anderem bereits das Pyridinium- und das Chinolinium-(p-methoxyphenylopentachlorostibanat) der Reihe beschrieben:


27) A. 421, 234.

28) P. Pfeiffer, B. 37, 4621.






29) B. 68, 56.





Die Monoarylopentachlorostibanate werden im allgemeinen durch Verzetzen einer falzsr. Löfung der Arylstibonfäuren mit einer falzsr. Löfung von Pyridin bzw. Chinolin als farblose, kristalline Niederschläge gewonnen. Um vollkommen farblose Salze zu erhalten, werden sowohl die falzsr. Löfungen der Arylstibonfäuren wie auch die falzsr. Löfungen des Pyridins bzw. Chinolins unmittelbar vor der Reaktion durch Schütteln mit Tierkohle entfärbt und filtriert. Die Ausbeute an den Doppelsalzen ist durchgängig recht gut. Es konnte auch bei diesen Chlorofalzen wieder festgestellt werden, daß die Pyridiniumsalze sich leichter ausscheiden als die Chinoliniumsalze. Als neue Verbindungen dieser Klasse habe ich in der vorliegenden Arbeit die folgenden dargestellt:



Cl



Cl




Alle diese Chlorofalze sind farblos oder schwachgelb.

Es konnte auch eine **Brom**verbindung gefaßt werden, indem β -Naphthylstibonfäure in 40%iger, wäßriger Bromwassertofflösung mit einer Löfung von Pyridin in dem gleichen Löfungsmittel ver-

30) Dieses Chlorofalz hat neuerzeit H. Schmidt (A. 421, 201) erhalten, indem er eine falzsr. Löfung der Phenylstibonfäure mit Pyridin versetzte. Es entstand ein farbloser Niederschlag, der aber von H. Sch. nicht weiter untersucht wurde.

fetzt wurde. Die Ausbeute war allerdings sehr schlecht. Die Zusammenfassung entspricht der Formel



Das Bromosalz besaß trotz mehrfacher Reinigung durch Umkristallisieren und Behandeln der Lösungen mit Tierkohle eine rot-orangene Farbe³¹⁾. Alle diese Chlorosalze zeigen gegenüber Schwefelwasserstoff das charakteristische Verhalten der aromatischen Antimonverbindungen.

Außer dem Monophenylpentachlorostibanat des Pyridiniums existiert auch eine entsprechende Diphenyltetrachloroverbindung; sie ist leicht zugänglich. H. Schmidt³²⁾ erwähnt schon dieses Salz, ohne aber eine Analyse oder eine nähere Untersuchung durchzuführen. Die Schmidt'sche Darstellung des Salzes wurde von mir dahingehend abgeändert, daß Diphenylantimon(5)chlorid



in wenig Aceton gelöst und diese Lösung mit einer salzsr. Pyridinlösung versetzt wurde. Die Ausbeute war bei genügender Konzentration der Reaktionspartner gut. Die Darstellung eines entsprechenden Chinoliniumsalzes wurde nicht versucht.

Mit dem Austausch zweier Chloratome durch 2 Phenylreste in dem komplexen Ion des Chlorostibanats ist die Bildungsmöglichkeit von Arylochlorostibanaten erschöpft, denn eine Verbindung



ließ sich nicht erhalten. Alle Versuche, aus Triphenylantimon(5)-chlorid $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SbCl}_2$ ³⁴⁾ durch Behandeln mit Chlorammonium bzw. salzsr. Chinolin oder Pyridin in Acetonlösung bei Gegenwart von Salzsäure, ein Chlorosalz darzustellen, waren erfolglos. Es wurde immer wieder das Ausgangsprodukt Triphenylantimon(5)-

31) Eine ähnliche Farbvertiefung von Cl über Br nach J ist schon von P. Pfeiffer in der Zinnreihe beobachtet worden (A. 376, 314).

32) A. 421, 187.

33) Michaelis und Reese. A. 233, 59.

34) Michaelis und Reese. A. 233, 44.

chlorid zurückerhalten. Folgende Tabelle orientiert über die nunmehr bekannten Pyridinium- und Chinoliniumsalze der Typen $(\text{ArSbCl}_5)\text{Me}$, $(\text{Ar}_2\text{SbCl}_4)\text{Me}$ und $(\text{SbCl}_6)\text{Me}$:

	H. Py [*]	H. Ch [*]
$(\text{SbCl}_6)'$	+	+
$(\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{SbCl}_5)'$	+	+
$((1,4)\text{CH}_3\text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{SbCl}_5)'$	+	+
$((1,3)\text{Cl} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{SbCl}_5)'$	+	+
$((\alpha)\text{C}_{10}\text{H}_7 \cdot \text{SbCl}_5)'$	+	+
$((\beta)\text{C}_{10}\text{H}_7 \cdot \text{SbCl}_5)'$	+	+
$((\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{SbCl}_4)'$	+	nicht dargestellt
$((\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SbCl}_3)'$	—	—

Hieraus folgt, daß maximal $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ der Chloratome der Chlorosalze des 5-wertigen Antimons durch aromatische Reste ersetzt werden können.

Die Existenz und die Zusammenfassung der arylierten Chloro- und Bromosalze der Antimonreihe stehen in bester Übereinstimmung mit der Werner'schen Koordinationslehre, insbesondere mit der Werner'schen Theorie der Doppelchloride (Chlorosalze), die so eine erhebliche Stütze erfährt. Wir kennen also nunmehr arylierte Chloro- und Bromosalze des 4-wertigen Zinns, die seiner Zeit von P. Pfeiffer untersucht worden sind³⁵⁾, und des 3- und 5-wertigen Antimons, also von 2 Elementen, die im periodischen System nebeneinander stehen.

Es lag nun nahe zu untersuchen, ob auch die aromatischen Arsenhalogenide zur Doppelsalzbildung befähigt sind. Daß das nicht der Fall ist, geht aus nachstehender Untersuchung hervor. In diesem Zusammenhang wäre es von Interesse, entsprechende Versuche mit aromatischen Germaniumhalogeniden anzustellen.

Der erste Versuch zur Darstellung eines Chlorosalzes des Arsens wurde am **p-Dimethylaminophenylarsinoxyd**



35) A. 376, 310—344.

ausgeführt. Dieses Oxyd wurde erstmals von Michaelis und Rabiner son³⁶⁾ erhalten und als farbloses, amorphes Pulver vom Schmelzpkt. 75° beschrieben. Später wiederholten H. Raudnitz und H. Heller³⁷⁾ die Arbeiten von Michaelis; sie erhielten nach Abänderung der Darstellungsmethode ein feinkristallines Pulver vom Schmelzpkt. 95°. Beide Beschreibungen beziehen sich auf ein unreines Produkt. Kristallisiert man nämlich das Arfinoxyd aus Schwefelkohlenstoff oder Aceton um, so erhält man eine vollkommen reine, wasserfreie Verbindung, deren Schmelzpkt. bei 198° liegt, also um mehr als 100° höher als die bisherigen Angaben. Molekulargewichtsbestimmungen ergaben, daß es sich um eine monomolekulare Verbindung handelt.

Aus dem Arfinoxyd ließ sich durch Behandeln mit Salzsäure das Chlorid



darstellen. Das Verfahren von Michaelis wurde unter Berücksichtigung der Löslichkeitsverhältnisse des Chlorids in Salzsäuren verschiedener Konzentration etwas abgeändert. Der Versuch aus dem Chlorid (bzw. aus dem Oxyd) mit salzsr. Pyridin ein Doppelsalz zu gewinnen war ohne Erfolg; es wurde das ursprüngliche Arsinchlorid zurückerhalten. Mit Methyljodid ergab das Arfinoxyd eine recht unbeständige Anlagerungsverbindung, der die Formel eines quaternären Ammoniumsalzes zukommt:




Zur Stabilisierung dieses Methylierungsproduktes wurde versucht, das Jodatom durch die komplexen, negativen Reste $(\text{PtCl}_6)''$ und $(\text{HgJ}_4)''$ zu ersetzen; jedoch konnten keine einheitlichen Produkte gefaßt werden.

Bei dem Behandeln des p-Dimethylaminophenylarfinoxyds mit Überchlorsäure konnte neben Arsentríoxyd ein Perchlorat erhalten werden, dem die Formel

36) A. 270, 140.

37) B. 60, I, 743.

38) A. 270, 142.




zukommt. Die Überchlorfäure wirkt hierbei disproportionierend auf das primäre Arfin ein nach der Gleichung:

$3 (\text{CH}_3)_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{AsO} \xrightarrow{\text{HClO}_4} ((\text{CH}_3)_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4)_3\text{As} + \text{As}_2\text{O}_3$.
Das aus dem tertiären Arfin $((\text{CH}_3)_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4)_3\text{As}$ mit Überchlorfäure erhaltene Perchlorat war identisch mit dem aus dem Arfenofokörper isolierten Produkte. Arsentrioxyd trat naturgemäß in diesem Fall nicht auf.


α -Naphtylarfen(3)chlorid und Triphenylarfin geben ebenfalls keine Chlorofalze mit salzsr. Pyridin.

Versuche, die von der Phenylarfonfäure und von der p-Aminophenylarfonfäure ausgingen und bezweckten, Chlorofalze mit γ -phenylarfonfäure



ausgingen und bezweckten, Chlorofalze mit γ wertigem Arfen zu erhalten, deren Analoge in der Antimonreihe ja besonders leicht zugänglich sind, führten ebenfalls nicht zum Ziel. Bei dieser Gelegenheit wurden 2 Hydrochloride der beiden Arfonfäuren erhalten, die schon früher Gegenstand einer Untersuchung von J. P r a t ^{39) 40)} waren.

Nach dem im Versuchsteil näher beschriebenen Verfahren sind diese Chloride jetzt sehr leicht zugänglich. J. P r a t formulierte sie als komplexe Arsenverbindungen mit der Koordinationszahl des Arsens = 4, z. B.:



Diese Schreibweise ist aber nicht eindeutig bewiesen.

Zum Schluß soll noch auf eine Arfonfäure, die H. S c h m i d t feinerzeit beschrieben hat ⁴¹⁾, eingegangen werden. Durch Diazo-

39) Bull. Soc. Chim. France 53, 1475—88.


40) C. 1933, II, 1513.

41) B. 59, I, 562—563.

Versuchsteil.

Aromatische Antimonverbindungen.

1. Pyridinium-(m-chlorphenylo-trichloro-stibiat)



Zur Darstellung dieses Chlorofalzes geht man von der weiter unten beschriebenen m-Chlorphenylstibonfäure aus, die zu m-Chlorphenylstibinoxyd $\text{Cl-C}_6\text{H}_4\text{-SbO}$ reduziert wird.

Darstellung des Stibinoxyds:

2 g m-Chlorphenylstibonfäure werden in 10 ccm rauch. Salzfäure (1,18) kalt gelöst; die Lösung wird mit 15 ccm Methylalkohol verdünnt, filtriert und mit etwa 8 ccm Wasser versetzt. Unter Eiskühlung wird in Gegenwart einer Spur Jodkaliums in die Lösung Schwefeldioxyd bis zur Sättigung eingeleitet; Dauer etwa 1—2 Std. Die reduzierte Lösung trägt man langsam unter Rühren in eine mit Eis gekühlte, starke, wässrige Ammoniaklösung ein. Sofort fällt das m-Chlorphenylstibinoxyd als farbloser, flockiger Niederschlag aus. Die Verbindung wird abfiltriert und dann mit Wasser und absol. Alkohol gewaschen. Nach zweitägigem Trocknen im Exsiccator über Phosphorpentoxyd ist das Stibinoxyd gewichtskonstant. Der Schmelzpkt. liegt über 240° ; Erweichungspunkt $155\text{—}60^\circ$.

Anal y se:

1.) 0,1727 g Sbft. verbrauchten nach Aufschluß 13,43 ccm n/10 J-Lsg.

2.) 0,2974 g " " " " 23,30 ccm n/10 J-Lsg.

$\text{C}_6\text{H}_4\text{OClSb}$ Ber. Sb 48,85 ;

Gef. Sb 1.) 47,36 ;

2.) 47,72 ;

Eigenschaften:

Die salzsr. Lösung des Stibinoxyds gibt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen schwachgelben, flockigen Niederschlag. Das Oxyd ist unlöslich in Wasser, wässrigem Alkalikarbonat und wässrigem Ätzkali, sowie in schwachen Säuren, z. B. Essigsäure; in der Wärme leichtlöslich in verd. Salzsäure, schwerlöslich in verd. Schwefelsäure; sehr gut löslich in kaltem Eisessig und in Essigsäureanhydr. In organischen Lösungsmitteln, wie Methylalkohol, Äthylalkohol, Benzol, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Äther, Ligroin, Aceton, Schwefelkohlenstoff und Dioxan auch in der Wärme unlöslich.

Darstellung des Pyridiniumsalzes:

Eine Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure wird langsam zu einer filtrierten Lösung von m-Chlorphenylstibinoxyd in Eisessig gegeben. Nach einiger Zeit treten farblose, gut ausgebildete Kristallbüschel auf, die zwischen gehärtetem Filtrierpapier und dann im Vakuum über Natronkalk getrocknet werden. Der Schmelzpkt. liegt bei 117—118°.


Analyse des Pyridiniumsalzes:

- 1.) 81,95 mg Sbft. verbrauchten 3,92 ccm n/10 J-Lsg.
 - 2.) 76,45 mg Sbft. verbrauchten 3,43 ccm n/10 J-Lsg.
 - 3.) 72,74 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 5,28 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.
 - 4.) 0,1100 g Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 7,92 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.
 - 5.) 4,298 mg Sbft. gaben verbrannt 0,120 ccm N (24°; 757,5 mm).
- C11H10NClSb Ber. Sb 29,02; Cl 25,34; N 3,34;
 Gef. 1) 29,13; 3) 25,74; 5) 3,20;
 2) 27,32; 4) 25,53;

Eigenschaften des Pyridiniumsalzes:

Mit verd. Alkalien gibt das Pyridiniumsalz schon in der Kälte den charakteristischen Geruch nach Pyridin. Eine Lösung des Salzes in 50%iger Essigsäure gibt mit Schwefelwasserstoff einen schwachgelben, flockigen Niederschlag.

2. Chinolinium-(m-chlorphenylo-trichloro-stibiat)



Eine filtrierte Lösung von m-Chlorphenylstibinoxyd in Eisessig wird mit einer Lösung von 20 Tropfen Chinolin in 10 ccm rauch. Salzsäure versetzt. Das Ganze wird im Exsiccator über Natronkalk der Kristallisation überlassen. Nach einiger Zeit setzen sich farblose Kristallbüschel ab, die zwischen gehärtetem Filtrierpapier und dann im Vakuum über Natronkalk getrocknet werden. Der Schmelzpkt. liegt bei 118—119° unter Grünfärbung.

Anal y s e :


0,1832 g Sbft. verbrauchen bei der elektrometr. Titration 11,90 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.

C₁₅H₁₂NCl₄Sb Ber. Cl 22,66;

Gef. Cl 23,03;

Mit verd. Alkalien gibt das Chinoliniumsalz schon in den Kälte den charakteristischen Geruch nach Chinolin. Leitet man in die Lösung des Salzes in 50%iger Essigsäure Schwefelwasserstoff ein, so fällt ein schwachgelber, flockiger Niederschlag aus.

3. Pyridinium-(α-naphtylo-trichloro-stibiat)



Zur Darstellung dieses Chlorofalzes geht man von der α-Naphtylstibon säure aus, deren Gewinnung weiter unten beschrieben wird. Die Stibon säure wird nach der Vorschrift von F. F. B l i c k e und U. O. O a k d a l e²⁾ in salzsr., methylalkoholischer Lösung durch 3-stündiges Einleiten von Schwefeldioxyd in Gegenwart einer Spur von Kaliumjodid reduziert. Nach einiger Zeit fällt aus der Lösung ein farbloser, kristalliner Niederschlag von α-Naphtylantimon(3)chlorid aus.

2) J. Amer. Chem. Soc. 55, 1198—1201.

Da in der Literatur nähere Angaben über diese Verbindung fehlen, seien diese hier nachgeholt:

Der Schmelzpkt. liegt bei 105° . Das Chlorid ist kalt leicht löslich in Äthylalkohol, Benzol, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Äther, Aceton, Eisessig, Essigsäureanhydr. und Dioxan; schwerlöslich in Ligroin; unlöslich in Wasser. Aus der Lösung in Äthylalkohol, Aceton oder Eisessig fällt beim Verdünnen mit Wasser ein farbloser, flockiger Niederschlag aus. Bei einem Versuch, das Chlorid aus Äthylalkohol umzukristallisieren, wurde eine farblose, amorphe Verbindung erhalten, deren Schmelzpkt. über 240° lag. Durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in die Eisessiglösung des Chlorids erhält man einen farblosen, flockigen Niederschlag.

Darstellung des Pyridiniumsalzes:

Zur Darstellung dieser Verbindung kann man von dem α -Naphtylantimon(3)chlorid oder von dem α -Naphtylstibinoxyd, das von F. F. Blicke und U. O. Oakdale³⁾ dargestellt und beschrieben wurde, ausgehen. Unsere Ausgangsverbindung war das Chlorid.

α -Naphtylantimon(3)chlorid $C_{10}H_7SbCl_2$ wird warm in möglichst wenig Eisessig gelöst. Zu der abgekühlten Lösung setzt man eine Lösung von 30 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure. Es entsteht in sehr geringer Ausbeute, unter Umständen erst nach einiger Zeit im Vakuum über Natronkalk, ein farbloser, kristalliner Niederschlag, der möglichst schnell abgesaugt und im Vakuum über Natronkalk getrocknet wird.

Analyse:

Die Analyse wurde mit einem frisch dargestellten Produkt ausgeführt.

3,644 mg Sbft. gaben 0,090 ccm N (20° ; 771,0 mm)

$C_{15}H_{13}NCl_3Sb$ Ber. N. 3,22;

Gef. N 2,92;

Eigenschaften des Pyridiniumsalzes:

Der Schmelzpkt. liegt undeutlich bei 90° . An der Luft tritt


3) J. Amer. Chem. Soc. 55, 1198—1201.

langsame Zersetzung ein. Die Verbindung zerfließt auf der Tonplatte, wobei der charakteristische Geruch von Pyridin auftritt. Aus der Eisessiglösung des Pyridiniumsalzes fällt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff ein weißer, flockiger Niederschlag aus. Gibt man zu der Eisessiglösung der Verbindung konz. Salzsäure, so bildet sich eine milchige Trübung. Mit verd. Alkalien entwickelt das Salz Pyridin.

4. Versuch zur Darstellung von Chinolinium-(α -naphthyl-trichloro-stibiat)

Eine konz. Eisessiglösung des α -Naphthylantimon(3)chlorids wurde mit einer Lösung von 20 Tropfen Chinolin in 10 ccm rauch. Salzsäure veretzt. Es wurde nach einer Woche im Exsiccator über Natronkalk keine Kristallbildung beobachtet. Beim Eindunsten über Natronkalk im Vakuum entstand endlich ein schmutzig weißer Rückstand, der mit verd. Alkalien kein Chinolin entwickelte. Von einer weiteren Untersuchung mußte wegen Mangel an Substanz Abstand genommen werden.

5. Pyridinium-(β -naphthyl-trichloro-stibiat)



Zur Darstellung dieses Chlorosalzes geht man von der β -Naphthylstibonsäure aus, die weiter unten näher beschrieben wird. Durch Reduktion dieser Stibonsäure gelangt man nach der Vorschrift von M. E. Brinnand, W. J. C. Dyke, W. H. Jones und W. J. Jones⁴⁾ zu dem β -Naphthylstibinoxid $C_{10}H_7-SbO$.

Da in der Literatur nähere Angaben über das Oxyd fehlen, sollen diese hier angeführt werden. Der Schmelzpunkt des Stibinoxids liegt undeutlich bei 135—140°. Die Verbindung ist leicht löslich in Eisessig und Essigsäureanhydr.; unlöslich in Methylalkohol, Äthylalkohol, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Ligroin,

4) J. Chem. Soc. London, 1932, 1815—19.

Aceton, Schwefelkohlenstoff und Dioxan. Die Eiseessiglösung des Oxyds gibt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen schwachgelben, flockigen Niederschlag.

Darstellung des Pyridiniumsalzes:

β -Naphthylstibinoxyd wird in möglichst wenig warmem Eiseessig gelöst. Die Lösung wird mit Tierkohle entfärbt und filtriert. Das Filtrat versetzt man mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure. Es entsteht ein farbloser, feinkristalliner Niederschlag, der abgeseugt und über Natronkalk getrocknet wird.

A n a l y s e:

13,44 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 0,93 ccm
n/10 AgNO_3 -Lsg.

$\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{NCl}_3\text{Sb}$ Ber. Cl. 24,44;

Gef. Cl 24,54;

Eigenschaften des Pyridiniumsalzes:

Das Salz löst sich auch in der Wärme nur schwer in verd. Alkalien; dabei tritt der charakteristische Geruch von Pyridin auf. Aus der Eiseessiglösung des Salzes fällt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff ein schwachgelber Niederschlag aus.

Da die Ausbeute an β -Naphthylstibinoxyd gering war, wurde der Versuch zur Darstellung der entsprechenden Chinoliniumverbindung nicht ausgeführt.

6. Versuch zur Darstellung von Pyridinium-(diphenyl-dichloro-stibiat)

Zur Darstellung eines Chlorosalzes des Diphenylantimon(3)-chlorids geht man von Diphenylstibinoxyd aus. H. Schmidt erwähnt zur Gewinnung des Diphenylstibinoxyds unter anderem ein Verfahren⁵⁾, wonach Phenylstibinoxyd unter Luftausschluß bei Wasserbadtemperatur in Diphenylstibinoxyd und Antimontrioxyd zerlegt wird. Ein neuer Weg zu dem Diphenylstibinoxyd zu gelangen, der den Vorzug hat, von einer gut kristallisierenden Verbindung, nämlich dem bekannten Diphenylantimon(5)chlorid

5) A. 421, 234.

(C_6H_5)₂SbCl₃ · H₂O⁶⁾, auszugehen, wird nachfolgend beschrieben. Man umgeht durch diese Methode leicht oxydierende Verbindungen wie das Phenylstibinoxyd.

Darstellung des Diphenylstibinoxyds:

Diphenylantimon(5)chlorid (C_6H_5)₂SbCl₃ · H₂O wird in Äthylalkohol gelöst und mit gleichen Raumteilen konz. Salzsäure versetzt. Unter dauernder Eiskühlung wird in Gegenwart einer Spur Kaliumjodids drei Stunden lang Schwefeldioxyd eingeleitet. Die reduzierte, gelbe Lösung wird in Eiswasser gegossen, wobei das farblose Diphenylstibinoxyd vom Schmelzpunkt 80° ausfällt. Es ist identisch mit dem nach der Methode von H. Schmidt⁷⁾ gewonnenem Oxyd, wie der Mischschmelzpunkt vom 80° zeigte.

Versuch zur Darstellung des Chlorofalzes:

Das Diphenylstibinoxyd wurde kalt in Aceton gelöst und die Lösung unter fortgesetzter Eiskühlung vorsichtig mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure versetzt. Es entstand eine farblose, feinkristalline Fällung. Der Niederschlag wurde abgeseigt und über Natronkalk getrocknet; der Schmelzpunkt der Verbindung lag bei 265°. Mit verd. Alkalien entwickelte das Salz Pyridin.

Analyse des rohen Produktes:

49,63 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 4,51 ccm
n/10 AgNO₃-Lsg.

Ber. für ((C_6H_5) ₂ SbCl ₂) · H · Py	Cl 16,61%
(C_6H_5) ₂ SbCl	Cl 11,39%
((C_6H_5) ₂ SbCl ₄) · H · Py	Cl 28,50%

Gef. Cl 32,22%

Das gesuchte Chlorofalz des 3-wertigen Antimons wurde also nicht erhalten; vielmehr läßt die Analyse und der hohe Schmelzpunkt vermuten, daß es sich im wesentlichen um das weiter unten beschriebene Pyridinium-(diphenyl-tetrachloro-stibanat) mit 5-wertigem Antimon handelt. Ein Mischschmelzpunkt der letzt genannten Verbindung mit dem oben erhaltenen Produkt, der bei

6) Michaelis und Reece, A. 233, 59.

7) A. 421, 234.

etwa 250° lag, bestätigte diese Vermutung. Bei dem Versuch hat also eine Oxydation statt gefunden.

7. Versuch zur Darstellung von Pyridinium-(triphenylchlorostibi-)

Triphenylstibin⁸⁾ vom Schmelzpunkt 48—50° (Literatur 53°) wurde in Aceton gelöst und die Lösung filtriert. Unter guter Kühlung wurde dann das Filtrat nach und nach mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure versetzt. Neben einer geringen, milchigen Trübung trat ein fast farbloses Öl auf, das nach zwei Stunden im Kühlschrank bei —7° kristallin erstarrte. Der Schmelzpunkt dieser Verbindung lag bei 49—50°. Der Schmelzpunkt eines Gemisches der Verbindung mit dem Ausgangsprodukt Triphenylstibin lag bei 47—49°. Mit verd. Alkalien wurde kein Pyridin entwickelt. Die Darstellung des Chlorofalzes gelang also nicht.

8. Pyridinium-(phenyl-pentachlorostibanat)



Dieses Chlorofalz des 5-wertigen Antimons wurde erstmals von H. Schmidt dargestellt⁹⁾, ohne näher untersucht oder analysiert zu werden.

Darstellung:

Phenylstibonfäure¹⁰⁾ wird in konz. Salzsäure warm gelöst und die Lösung auf dem Wasserbad kurze Zeit mit Tierkohle behandelt und filtriert. Dann wird das hellgelbe Filtrat mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure versetzt. Es entsteht augenblicklich ein farbloser, kristalliner Niederschlag, der abgeseugt und über Natronkalk getrocknet wird. Der Schmelzpunkt liegt bei 105° unter Zersetzung.

8) P. Pfeiffer, B. 37, 4621.

9) A. 421, 201.

10) H. Schmidt, A. 421, 188.

Analyse:

- 1.) 36,35 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 3,86 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.
- 2.) 0,3706 g Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 39,08 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.
- 3.) 0,1076 g Sbft. verbrauchten nach Aufschluß 4,71 ccm n/10 J-Lsg.


C₁₁H₁₁Cl₅NSb Ber. Cl 38,86; Sb 26,70;
 Gef. 1.) Cl 37,66; 3.) Sb 26,67;
 2.) Cl 37,39;

Eigenschaften des Pyridiniumsalzes:

Die Verbindung entwickelt mit verd. Alkalien den charakteristischen Geruch nach Pyridin. Sie ist in Wasser unlöslich. Aus einer Lösung in konz. Salzsäure gibt das Salz beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen schwachgelben, flockigen Niederschlag. Die Verbindung ist leichtlöslich in Methylalkohol, Äthylalkohol, Aceton, Essigsäureanhydrid, Dioxan, warmem Eisessig, warmen Ligroin und warmem Schwefelkohlenstoff; unlöslich in Benzol, Chloroform, Äther und Tetrachlorkohlenstoff.

Es wurde versucht, die Verbindung aus Methylalkohol umzukristallisieren. Der Schmelzpunkt des erhaltenen Produktes war etwa 120°, also höher. Eine Analyse der auskristallisierten Verbindung ergab jedoch einen Chlorgehalt von nur 22,55%. Höchstwahrscheinlich war Hydrolyse eingetreten.

9. m-Chlorphenylstibonsäure



Die Säure wurde erstmals von H. Schmid t und Fr. Hoffmann¹¹⁾ aus m-Chlorbenzoldiazoniumfluorid, das als komplexe Anlagerungsverbindung an Borfluorid vorlag (Cl-C₆H₄-N₂). (BF₄),

11) D.R.P. 493 690, C. 1930, I, 3485.

durch Umsatz mit Antimontrichlorid in Pyridinlösung hergestellt. Nähere Angaben über die Darstellung und Eigenschaften der Säure werden von H. Schmidt in dem Patent nicht gemacht. In der nachfolgenden Darstellung wird eine neue Methode beschrieben, die dem allgemeinen Verfahren von H. Schmidt¹²⁾ zur Darstellung von Stibonsäuren entspricht.


Darstellung:

25,5 g frisch destilliertes m-Chloranilin werden in 180 ccm konz. Salzsäure in der Wärme gelöst und mit 200 ccm Wasser verdünnt. Die Lösung wird durch Eintragen von Eisstücken abgekühlt. Ausfallendes, salzsaures m-Chloranilin stört nicht. Das Ganze wird unter Rühren und Kühlen mit Eis bei etwa -5° mit 13,8 g Natriumnitrit (in 20%iger wässriger Lösung) diazotiert. Nach Beendigung der Diazotierung (Prüfung mit Kaliumjodid-stärkepapier) gibt man unter fortgesetztem Rühren und Kühlen langsam eine Lösung von 29,1 g Antimontrioxyd in 170 ccm rauch. Salzsäure zu. Es entsteht augenblicklich ein hellgelber, kristalliner Niederschlag von $(\text{Cl} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{-N}_2) \cdot (\text{SbCl}_4)$, der abgelaugt und abgepresst wird. Das Reaktionsprodukt zerfällt allmählich an der Luft, sehr schnell bei Zugabe von Wasser.

Zur weiteren Verarbeitung wird das Diazoniumdoppelsalz in einen Stutzen gebracht und mit 10%iger Natronlauge im Überschuß versetzt. Es tritt unter Braunfärbung starke Stickstoffentwicklung auf. Nach einem Tag filtriert man von dem braunen Rückstand ab und fällt aus dem gelben Filtrat durch Neutralisieren mit einer Mineralsäure die rohe, violett bis braun gefärbte m-Chlorphenylstibonsäure aus. Die rohe Säure wird abgelaugt, mit Wasser ausgewaschen und die feuchte, braune Paste ohne weitere Trocknung in möglichst wenig konz. Salzsäure heiß gelöst. Bis auf einen geringen, schwarzen Rückstand geht alles in Lösung. Man filtriert und versetzt das Filtrat mit einer kaltgesättigten Lösung von Ammoniumchlorid in konz. Salzsäure. Es fällt nach kurzer Zeit ein lachsfarbener, kristalliner Niederschlag aus, der ab-

12) A. 421, 174—246.

gefaugt und mehrmals mit wenig konz. Salzfäure ausgewaschen wird. Die Verbindung ist das weiter unten beschriebene Ammonium-(m-chlorphenylo-pentachloro-stibanat)



Mit Wasser hydrolysiert die Verbindung zu der farblosen m-Chlorphenylstibonfäure. Der flockige Niederschlag wird abgefaugt, gut mit Wasser ausgewaschen und auf Ton an der Luft getrocknet.

Eigenschaften der Stibonfäure:

Die m-Chlorphenylstibonfäure ist ein farbloses, amorphes Pulver mit schwankendem Wassergehalt. Die Lösung der Säure in konz. Salzfäure gibt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen schwachgelben, flockigen Niederschlag. Sie ist in Benzol, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, Äther und Ligroin unlöslich; schwerlöslich in Aceton, Methylalkohol, Äthylalkohol und Schwefelkohlenstoff, aber löslich in Chloroform, Dioxan, warmem Eisessig und warmem Essigsäureanhydr. In verd. und konz. Mineral Säuren wie in Alkalien ist die Säure leichtlöslich. Nach 2-tägigem Trocknen im Exsiccator über Phosphorpentoxyd ist die Verbindung gewichtskonstant. Der Gewichtsverlust beträgt etwa 8%.

Anal y se:

1.) 0,1552 g Sbft. verbrauchten nach Aufschluß 10,77 ccm n/10 J-Lsg.

2.) 0,2436 g Sbft. verbrauchten nach Aufschluß 16,94 ccm n/10 J-Lsg.


$\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_3\text{ClSb}$

Ber. Sb 42,99;

Gef. Sb 1.) 42,26;

2.) 42,36;

Ammonium-(m-chlorphenylo-pentachloro-stibanat)



Darstellung:

Die farblose m-Chlorphenylstibonfäure wird in wenig konz. Salzfäure warm gelöst und mit einer kaltgesättigten Lösung von Ammoniumchlorid in konz. Salzfäure versetzt. Nach einiger Zeit

fällt das Chlorofalz als hellgelber Niederschlag aus. Die Kristalle werden abgeseugt, mit wenig konz. Salzsäure ausgewaschen und auf Ton im Vakuum über Natronkalk 24 Std. lang getrocknet. Der Schmelzpunkt der Verbindung liegt über 240°.


Eigenschaften:

In Wasser hydrolysiert das Chlorofalz zu der farblosen m-Chlorphenylstibonsäure. Das Salz ist unlöslich in Benzol, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, Äther, Ligroin und Schwefelkohlenstoff; schwerlöslich in Chloroform, Dioxan und Aceton; dagegen leichtlöslich in Methylalkohol, Äthylalkohol, warmem Eisessig und warmem Essigsäureanhydr.

Analysen:

- 1.) 10,968 mg Sbft. gaben bei der Verbrennung
0,325 ccm N (24°; 757 mm)
 - 2.) 6,168 mg Sbft. gaben bei der Verbrennung
0,182 ccm N (24°; 754 mm)
 - 3.) 0,4705 g Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration
31,25 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.
- C₆H₅NClsSb Ber. N 3,27; Cl 41,36;
Gef. N 1.) 3,39; Cl 3.) 40,97;
2.) 3,36;

10. Pyridinium-(m-chlorphenyl-pentachloro-stibanat).



m-Chlorphenylstibonsäure wird in konz. Salzsäure gelöst und mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure versetzt; es tritt sofort ein farbloser, kristalliner Niederschlag auf, der abgeseugt und auf Ton über Natronkalk im Exsiccator getrocknet wird. Das Chlorofalz entwickelt mit verd. Alkalien Pyridin. Löst man die Verbindung in verd. Salzsäure und leitet in die Lösung Schwefelwasserstoff ein, so fällt ein fast farbloser, flockiger Niederschlag aus.

Analyse:


15,78 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration

1,61 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.

C₁₁H₁₀NCl₆Sb Ber. Cl 36,14;

Gef. Cl 36,18;

11. Chinolinium-(m-chlorphenylo-pentachloro-stibanat).



m-Chlorphenylstibonfäure wird in konz. Salzsäure gelöst und mit einer Lösung von 20 Tropfen Chinolin in 10 ccm rauch. Salzsäure versetzt. Es fällt ein farbloser, kristalliner Niederschlag aus. Die Kristalle werden abgefaugt und auf Ton über Natronkalk getrocknet. Mit verd. Alkalien gibt die Verbindung den charakteristischen Geruch nach Chinolin. Aus einer verd. Salzsäurelösung fällt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff ein farbloser, flockiger Niederschlag aus.

Analyse:


28,30 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration

2,63 ccm n/10 AgNO₃-Lösung.

C₁₅H₁₂NCl₆Sb Ber. Cl 32,79;

Gef. Cl 32,95;

12. α-Naphtylstibonfäure




Die Säure wurde erstmalig von W. Riddell und St. Basterfield durch Diazotierung von α-Naphtylamin und Umsatz mit Antimontrichlorid dargestellt¹³⁾; R. und B. machen aber keine näheren Angaben. Ebenso wenig geben F. F. Blicke und U. O.

13) Trans. Roy. Soc. Canada 1929, III, 45—52.

Oakdale¹⁴⁾ bei der Darstellung der Säure die Arbeitsmethode, die Ausbeute und die Zwischenkörper an. Da wir selbst bei der Darstellung der α -Naphthylstibonfäure sehr schlechte Ausbeuten feststellen mußten, und zudem der Zwischenkörper ($C_{10}H_7-N_2$). ($SbCl_4$) von May¹⁵⁾ falsch formuliert und nur unrein erhalten worden war, weiterhin das zur Reinigung der Stibonfäure dargestellte Ammonium-(α -naphthyl-pentachloro-stibanat) ($C_{10}H_7 \cdot SbCl_5$). NH_4 in der Literatur noch nicht erwähnt ist, sei im Folgenden die Darstellung der α -Naphthylstibonfäure ausführlich behandelt.

α -Naphthyl-diazonium-(tetrachloro-stibiat)



Darstellung:

57 g α -Naphthylamin werden in einem Gemisch von 80 ccm rauch. Salzfäure und 800 ccm Wasser eingetragen und das Ganze zum Sieden erhitzt. Die violett gefärbte Lösung wird mit Tierkohle aufgeköcht, heiß filtriert und das farblose Filtrat durch Eintragen von Eis auf 0° abgekühlt. Ausfallendes α -Naphthylaminhydrochlorid stört bei der Weiterverarbeitung nicht. Unter dauerndem Rühren werden dann 1000 ccm rauch. Salzfäure zugefetzt (oder noch besser, Chlorwasserstoff bis zur Sättigung eingeleitet). Die auf etwa — 9 bis — 10° abgekühlte Suspension wird mit 28 g Natriumnitrit (in 20%iger, wässriger Lösung) diazotiert. Die Diazotierung ist nach einer halben Stunde beendet. Die hellgelbe, klare Diazoniumsalzlösung wird in eine eisgekühlte Lösung von 58 g Antimontrioxyd in 600 ccm rauch. Salzfäure eingetragen. Es entsteht sofort eine kristalline Fällung von goldgelben Nadeln. (May¹⁵⁾ erhielt ein braunes, amorphes Pulver.) Der Niederschlag

14) J. Amer. Chem. Soc. 55, 1198—1201.

15) J. Chem. Soc. London 101, 1039.

wird abgefaugt, abgepreßt und über Atznatron im Vakuum einen Tag lang getrocknet. Die Verbindung zersetzt sich bei 99—101°. Die Ausbeute beträgt etwa 100 g.

Wichtig für die Bildung der Anlagerungsverbindung ist, daß in stark salzsr. Lösung gearbeitet wird, da anderenfalls Antimontrichlorid zur antimonigen Säure hydrolysiert wird.

Anal yse des Diazoniumdoppelfalzes:

0,2103 g Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration

20,17 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.

0,4284 g Sbft. verbrauchten nach Aufschluß 20,26 ccm n/10 J-Lsg.

C₁₀H₇N₂Cl₄Sb Ber. Cl 33,88; Sb 29,09;

Gef. Cl 34,01; Sb 28,80;

Eigenschaften:

Im Tageslicht zersetzt sich das Diazoniumsalz langsam unter Grünfärbung. In der offenen Flamme verpufft die Verbindung. Das Salz läßt sich leicht aus rauch. Salzsäure umkristallisieren. Es ist leichtlöslich in kaltem Wasser; mit warmem Wasser tritt Zer-
setzung ein. Löst man das Diazoniumsalz in verd. Salzsäure und leitet Schwefelwasserstoff ein, so fällt ein tieferer (nicht orange-
ner), flockiger Niederschlag aus. In organischen Lösungsmitteln ist das Salz unlöslich, außer in warmem Eisessig und warmem Essig-
säureanhydrid. Mit Methylalkohol zersetzt sich die Verbindung schon in der Kälte.

Die Zersetzung des Diazoniumdoppelfalzes zur Stibonsäure:

Um die Bedingungen für die beste Ausbeute an α -Naphthylstibonsäure zu ermitteln, wurden systematische Versuche zur Zer-
setzung des Diazoniumdoppelfalzes angestellt; die Zersetzungsdauer bei allen Versuchen betrug 24 Std.

1. konz. Salzsäure (1,13) in der Wärme	keine N ₂ -Entwicklung
2. verd. „ (1,05 auf dem Wasserbad	wenig „
3. „ „ + CuSO ₄ „ „	langsame „
4. „ „ + Cu-Pulver „ „	„ „
5. Wasser auf dem Wasserbad	„ „

- | | |
|---|------------------------------------|
| 6. Pyridin in der Kälte ¹⁷⁾ | starke N ₂ -Entwicklung |
| 7. 30 %ige wässrige Sodalösung in der Kälte, erst | |
| CO ₂ -Entwicklung, dann | „ „ |
| 8. 10 %ige wässr. Natronlauge auf dem Wasserbad | sehr langsame „ |
| 9. „ „ „ in der Kälte unter | |
| Zusatz von Glycerin ¹⁸⁾ | starke „ |
| 10. 20 %ige wässrige Natronlauge in der Kälte | „ „ |
| 11. 40 %ige „ „ „ auf d. Wasserbad | wenig „ |

Bei allen Versuchen außer 1. trat Stickstoffentwicklung auf; alle Versuche außer 6. gaben bei der weiteren Aufarbeitung als Endprodukt anorganische Antimonverbindungen. Nur der Versuch 6. lieferte eine geringe Ausbeute an α -Naphthylstibonsäure; die Säure wurde einerseits durch die Bildung des weiter unten beschriebenen Ammonium-(α -naphthyl-pentachloro-stibates), andererseits durch die Entstehung eines schwachgelben (nicht orangenen!) Niederschlags mit Schwefelwasserstoff in salzsr. Lösung nachgewiesen. Da aber die Zersetzung durch Pyridin bei größeren Mengen des Diazoniumsalzes unter heftigem Verpuffen des Reaktionsproduktes erfolgt und zudem das Verfahren kostspielig ist, so wurde mit 10%iger Natronlauge unter dauerndem Rühren in 8-tägiger Versuchsdauer zersetzt. Die Ausbeute an Stibonsäure war unter diesen Umständen annehmbar.

α -Naphthylstibonsäure.

Darstellung:

100 g α -Naphthyl-diazonium-(tetrachloro-stibiat) werden mit 3 l 10%iger wässriger Natronlauge 8 Tage lang unter dauerndem Rühren zersetzt. Man filtriert von dem braunen, amorphen Rückstand, der das Hauptreaktionsprodukt darstellt, ab und neutralisiert das hellgelbe Filtrat vorsichtig unter Kühlen mit Eis mit verd. Salzsäure. Es fällt ein flockiger, schmutzig weißer Niederschlag aus, der abfiltriert und an der Luft auf Ton getrocknet wird. Die Ausbeute beträgt im besten Fall 4 g der rohen Säure. Zur Reinigung der rohen Stibonsäure wird sie in möglichst wenig konz. Salzsäure heiß gelöst und die Lösung mit Tierkohle versetzt und

17) Vgl. C. 1926, II, 1590.

18) Vgl. C. 1926, II, 1691.

filtriert. Zu dem gelben Filtrat wird festes Ammoniumchlorid gegeben. Nach einiger Zeit entsteht ein rotbrauner, kristalliner Niederschlag, der abgelaugt und abgepreßt wird. Das so erhaltene Ammonium-(α -naphtylo-pentachloro-stibanat) wird in viel Wasser eingetragen; es tritt Hydrolyse zur farblosen α -Naphtylstibonsäure ein, die abgelaugt und 24 Stund. lang im Vakuum über Phosphor-pentoxyd getrocknet wird.

Analyse der Stibonsäure:

0,2998 g SbSt. verbrauchten nach Aufschluß 19,85 ccm n/10 J-Lsg.
 $C_{10}H_6O_3Sb$ Ber. Sb 40,75;
 Gef. Sb 40,33;

Eigenschaften der Stibonsäure:

Die reine α -Naphtylstibonsäure ist ein farbloses, sprödes Pulver. In konz. Salzsäure ist sie mit gelber Farbe leichtlöslich; beim Erkalten fällt aus dieser Lösung ein weißer, kristalliner Niederschlag aus, — höchstwahrscheinlich α -Naphtylantimon(5)chlorid, — der unter Zusatz von Methylalkohol sich wieder auflöst. Die Lösung der Stibonsäure in heißer, konz. Salzsäure gibt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen schwachgelben, flockigen Niederschlag. Die Säure ist leichtlöslich in Aceton, Essigsäureanhydr., Dioxan und warmem Eisessig; dagegen unlöslich in Methylalkohol, Tetrachlorkohlenstoff und Petroläther.

Ammonium-(α -naphtylo-pentachloro-stibanat)

Darstellung:

α -Naphtylstibonsäure wird in möglichst wenig konz. Salzsäure gelöst. Der Lösung wird Tierkohle zugesetzt und nach einiger Zeit das Ganze filtriert. Das gelbe Filtrat wird mit einer kaltgesättigten Lösung von Ammoniumchlorid in verd. Salzsäure versetzt. Nach einigen Stunden fällt ein orangeroter Niederschlag aus. Die Kristalle werden abgelaugt und über Natronkalk im Vakuum getrocknet. Der Schmelzpunkt der Verbindung liegt über 240° ; bei etwa 200° beginnt das Chlorofalz zu sublimieren.

Eigenschaften:

Die Verbindung ist schwerlöslich in konz. Salzsäure; unlöslich in allen organischen Lösungsmitteln; dagegen leichtlöslich in verd. Salzsäure. Wird die Verbindung in Wasser eingetragen, so hydrolysiert sie zur α -Naphthylstibonsäure.

Analyse:

37,60 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration

4,20 ccm n/10 AgNO_3 -Lsg.

$\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{NCl}_5\text{Sb}$ Ber. Cl 39,91;

Gef. Cl 39,61;

13. Pyridinium-(α -naphtylo-pentachloro-stibanat)

$\text{SbCl}_5 \cdot \text{H} \cdot \text{Py}$



Darstellung:

α -Naphthylstibonsäure wird in wenig warmem Eisessig gelöst. Die Lösung wird abgekühlt und mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure versetzt. Nach einiger Zeit fällt ein schwachgelber, kristalliner Niederschlag aus, der abgeseugt und auf Ton über Natronkalk im Exsiccator getrocknet wird.

Eigenschaften:

Das Pyridiniumsalz schmilzt bei $187-189^\circ$. Die Lösung der Verbindung in einem Gemisch von gleichen Teilen Eisessig und konz. Salzsäure gibt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen hellgelben, flockigen Niederschlag. Mit verd. Alkalien entwickelt die Verbindung schon in der Kälte den charakteristischen Geruch nach Pyridin. An der Luft zersetzt sie sich nach einiger Zeit; die hellgelbe Farbe verblaßt; der Schmelzpunkt sinkt und wird undeutlich.

Analyse:

5,578 mg Sbft. gaben bei der Verbrennung

0,135 ccm N (20° ; 751 mm).

12,73 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration

1,26 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.

C₁₅H₁₃NCl₅Sb

Ber. N 2,77; Cl 35,03;

Gef. N 2,79; Cl 35,10;

14. Chinolinium-(α -naphtylo-pentachloro-ftibanat)

SbCl₅ · H · Ch




Darstellung:

α -Naphtylftibonfäure wird in heißer konz. Salzfäure gelöst und die Lösung abgekühlt. Zu dem Ganzen wird eine Lösung von 20 Tropfen Chinolin in 10 ccm rauch. Salzfäure gegeben. Es fällt augenblicklich ein farbloser Niederschlag aus. Die Verbindung wird abgesaugt und über Natronkalk im Exsiccator aufbewahrt. Eine Analyse konnte wegen zu geringer Ausbeute an Ausgangsmaterial nicht ausgeführt werden.

Eigenschaften:

Mit verd. Alkalien entwickelt das Chinoliniumsalz den charakteristischen Geruch nach Chinolin. Aus einer Lösung der Verbindung in Eisessig fällt Schwefelwasserstoff einen schwachgelben, flockigen Niederschlag aus.

15. β -Naphtylftibonfäure.



Die Vorschrift zur Darstellung der β -Naphtylftibonfäure von M. E. Brinnand, W. J. C. Dyke, W. H. Jones und W. J. Jones¹⁹⁾ wird abgeändert; die Darstellung der β -Naphtylftibonfäure erfolgt analog der α -Naphtylftibonfäure:

19) J. Chem. Soc. London, 1932, 1815—1819.

Die wäßrige, violette Lösung von β -Naphthylaminhydrochlorid wird in der Siedehitze mit Tierkohle entfärbt und filtriert. Das Filtrat wird diazotiert und die gelbbraune Lösung des Diazoniumsalzes in der Kälte wiederum mit Tierkohle behandelt und filtriert. Der farblosen Lösung wird eine klare Lösung von Antimontrioxyd in rauch. Salzsäure zugefetzt. Es fällt ein hellgelber, kristalliner Niederschlag der Formel $(C_{10}H_7-N_2) \cdot (SbCl_4)$ aus. Das Diazoniumdoppelsalz wird abgefaugt, mehrmals mit rauchender Salzsäure ausgewaschen und endlich über Natronkalk im Exsiccator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 90% der theor.

Eigenschaften des Diazoniumdoppelsalzes:

May²⁰⁾ beschreibt die Verbindung als ein amorphes, braunes Pulver. Brinnand und Mitarbeiter²¹⁾ machen gar keine Angaben über die Verbindung. Das Diazoniumdoppelsalz kristallisiert in goldgelben Nadeln, die sich unscharf bei 100—120° zersetzen. Die Verbindung ist an der Luft sehr beständig, im Gegensatz zu den Angaben in der Literatur. Sie ist in Eisessig und Essigsäureanhydr. farblos, in warmem Methylalkohol mit gelber Farbe leichtlöslich; dagegen unlöslich in Äthylalkohol, Benzol, Toluol, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Äther, Petroläther, Dioxan, Schwefelkohlenstoff, Aceton und kalter rauch. Salzsäure. Die Verbindung zersetzt sich mit Wasser allmählich unter Braunfärbung.

Analyse des Diazoniumdoppelsalzes:

57,40 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration

5,03 ccm n/10 $AgNO_3$ -Lösung.

Ber. für $C_{10}H_7N_2Cl_4Sb$ Cl 33,88;

Ber. für $C_{10}H_7N_2Cl_4Sb + 2 H_2O$ Cl 31,18; Gef. 31,07;

Die Zersetzung des Diazoniumdoppelsalzes nach der Vorschrift von Brinnand und seinen Mitarbeitern²¹⁾ ergibt eine Ausbeute an β -Naphthylstibonsäure von maximal 2% der theor. Systematische Versuche zur Verbesserung der Ausbeute durch Zersetzung des Diazoniumsalzes mit Wasser, 20%iger Soda, 2 n wäßrigen Ammo-

20) J. Chem. Soc. London, 101, 1039.

21) J. Chem. Soc. London, 1932, 1815—19.

niak, 10%iger, 20%iger und 40%iger Natronlauge ergaben keine höheren Ausbeuten.


Darstellung der β -Naphthylstibonfäure:

β -Naphtyldiazonium-(tetrachlorostibiät) wird mit 10%iger Natronlauge unter dauerndem Rühren in 8-tägiger Versuchsdauer zersetzt. Die weitere Aufarbeitung und Reinigung der Stibonfäure entspricht vollkommen der schon oben beschriebenen Darstellungsweise der α -Naphthylstibonfäure.

Eigenschaften der β -Naphthylstibonfäure:

Die reine Säure ist ein farbloses, sprödes Pulver von hohem Schmelzpunkt. Sie löst sich leicht in heißer, konz. Salzsäure; beim Erkalten fällt aus dieser Lösung ein farbloser, kristalliner Niederschlag aus, — höchstwahrscheinlich β -Naphtylantimon(5)chlorid, — der sich an der Luft augenblicklich unter Dunkelfärbung zersetzt. Längeres Erwärmen einer salzsr. Lösung der Stibonfäure führt zur Zerfetzung unter Bildung von β -Naphthol und anorganischer Antimonverbindung (Prüfung mit Schwefelwasserstoff). Eine Lösung der Verbindung in Eisessig gibt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen hellgelben, flockigen Niederschlag.

16. Pyridinium-(β -naphtylo-pentachloro-stibanat)



Darstellung:

β -Naphthylstibonfäure wird ohne Erwärmen in einem Gemisch von 1 Tl. Eisessig und 1 Tl. konz. Salzsäure gelöst; Ungelöstes wird durch Zusatz von wenig Wasser in Lösung gebracht. Das Ganze wird filtriert und das Filtrat mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure veretzt. Es fällt ein schwachgelber, feinkristalliner Niederschlag aus, der abgesaugt und über Natronkalk im Exsiccator getrocknet wird. Das gebildete Pyridiniumsalz schmilzt und zersetzt sich unter Braunfärbung bei 200—202°.

Eigenschaften:

Das Pyridiniumsalz ist leichtlöslich in Methyl- und Äthylalkohol; jedoch fällt nach einiger Zeit aus der kalten Lösung ein farbloser Niederschlag aus; es bildet sich höchstwahrscheinlich infolge Hydrolyse β -Naphthylstibonsäure zurück, da der Schmelzpunkt der neuen Verbindung über 260° steigt; auch entwickelt der farblose Niederschlag mit verd. Alkalien keinen Geruch nach Pyridin mehr und gibt, in Eisessig gelöst, beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen hellgelben Niederschlag von aromatischem Antimontrichlorid.

In fast allen organischen Lösungsmitteln ist das Pyridiniumsalz unlöslich, außer in Aceton, Eisessig, Essigsäureanhydr. und Dioxan. Aus Eisessig bzw. Essigsäureanhydr. Lösung kristallisieren beim Eindunsten über Natronkalk im Vakuum geruchlose, farblose Substanzen aus, die mit verd. Alkali kein Pyridin mehr entwickeln, beim Erhitzen Essigsäure abgeben und aus Eisessiglösung beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen hellgelben Niederschlag erzeugen; höchstwahrscheinlich liegt in beiden Fällen ein Acetat der Reihe vor. Das Pyridiniumsalz zeigt mit verd. Alkalien und Schwefelwasserstoff die charakteristischen Reaktionen der aromatischen Chlorofalze.

Analyse:


58,11 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 5,73 ccm $n/10$ AgNO_3 -Lsg.

0,1860 Sbft. verbrauchten nach Aufschluß 7,35 ccm $n/10$ J-Lsg.

$\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{NCl}_5\text{Sb}$ Ber. Cl 35,03; Sb 24,06;

Gef. Cl 34,97; Sb 24,06;

17. Chinolinium-(β -naphtylo-pentachloro-stibanat)



Darstellung:

β -Naphthylstibonsäure wird bei Wasserbadtemperatur in wenig Eisessig gelöst und mit Tierkohle versetzt. Nach 10 min. wird das Ganze filtriert und zum Filtrat eine Lösung von 20 Tropfen Chi-

nolin in 10 ccm rauch. Salzfäure gegeben, die zur Entfärbung 20 Min. lang in der Kälte mit Tierkohle behandelt und dann filtriert worden ist. Es fällt ein hellgelber, feinkristalliner Niederschlag aus, der sich nach einiger Zeit absetzt. Die Kristalle werden abgelaugt und auf Ton über Natronkalk mehrere Tage getrocknet. Das Chinoliniumsalz erweicht bei 110°; bei etwa 140° beginnt die Verbindung sich dunkel zu färben und schmilzt endlich bei 174—176° unter Zersetzung.

Eigenschaften:


Das Chinoliniumsalz ist leichtlöslich in Aceton, Essigsäureanhydr., warmem Eisessig, warmem Methyl- und Äthylalkohol, mit der Einschränkung, daß Methyl- und Äthylalkohol nach einiger Zeit das Chlorosalz zur farblosen, unlöslichen Stibonsäure zersetzen. In kaltem Eisessig ist die Verbindung schwerlöslich; in Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Äther, Ligroin und Dioxan unlöslich. Ebenso ist das Chlorosalz unlöslich in konz. Salzfäure. Durch Wasser und wässrige Soda wird die Verbindung zur farblosen Stibonsäure hydrolysiert. Aus einer heißen Lösung des Chinoliniumsalzes in gleichen Teilen Eisessig und konz. Salzfäure fällt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff ein hellgelber Niederschlag aus. Bei der Behandlung der Verbindung mit verd. Alkalien entwickelt sich Chinolin.

Analyse:

58,40 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 5,18 ccm
n/10 AgNO₃-Lösung.

C₁₆H₁₅NCl₅Sb Ber. Cl 31,87;
Gef. Cl 31,45;

18. Pyridinium-(β-naphtylo-pentabromo-stibanat)



Darstellung:

Zu einer Lösung von β-Naphtylstibonsäure in Eisessig wird ein gleiches Volumen einer 40%igen, wässrigen Bromwasserstoffsäurelösung

gegeben und das Ganze einige Zeit auf dem Wasserbad mit Tierkohle behandelt. Die heiße Lösung wird von der Tierkohle abfiltriert und das hellgelbe Filtrat mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm 40%iger, wässriger Lösung von Bromwasserstoff, die vor der Verwendung ebenfalls mit Tierkohle gereinigt worden ist, vermischt. Nach einiger Zeit beginnt ein roter, kristalliner Niederschlag auszufallen; er wird nach einem Tag abgeseigt und auf Ton über Natronkalk im Exsiccator getrocknet. Die Ausbeute ist sehr gering. Der Schmelzpunkt der aus Aceton umkristallisierten Verbindung liegt bei 193—195°.

Eigenschaften:

Die Verbindung läßt sich aus Aceton umkristallisieren; dabei hellt sich die Farbe etwas auf; der Körper ist orangerot. Das Bromosalz zeigt die charakteristischen Reaktionen der aromatischen Halogenosalze mit verd. Alkalien (Pyridinentwicklung) und mit Schwefelwasserstoff (gelber, flockiger Niederschlag). Das Salz ist leicht löslich in Eisessig.

Analyse:

11,60 mg SbSt. gaben bei der Verbrennung 0,190 ccm N (21°; 766 mm).


50,10 mg SbSt. verbrauchten bei der elektrometr. Titration

3,42 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.

C₁₅H₁₃NBr₅Sb Ber. N 1,92; Br 54,85;

Gef. N 1,92; Br 54,56;


19. Pyridinium-(diphenyl-tetrachloro-stibanat)



Nach der Vorschrift von H. Schmidt²²⁾ wird zunächst aus der Phenylstibonsäure das schon auf anderem Wege von Michailis und Reefe²³⁾ erhaltene Diphenylantimon(5)chlorid vom Schmelzpunkt 176—77° (Literatur 175°) hergestellt:

22) A. 421, 200.

23) A. 233, 59.



Das Chlorid ist, wie zur Ergänzung der Literaturangaben bemerkt sei, in verd. Alkalien, Methylalkohol, Äthylalkohol, Aceton, Eisessig, Essigsäureanhydr., warmem Benzol, warmem Tetrachlorkohlenstoff, warmem Dioxan, Chloroform und Äther leichtlöslich; unlöslich in Wasser und kalter konz. Salzsäure. Aus heißer konz. Salzsäure läßt es sich umkristallisieren.

Das Diphenylantimon(5)chlorid dient nun als Ausgangskörper zur Darstellung des Pyridinium-(diphenyl- tetrachloro-stibanats); H. Schmidt hat neuerzeit Diphenylantimon(5)chlorid in heißer Salzsäure gelöst und zu der Lösung Pyridin zugefetzt; er erhielt einen Niederschlag, den er aber nicht weiter untersucht hat.²⁴⁾

Man verfährt zur **Darstellung des Chlorofalzes** zweckmäßig folgendermaßen: Diphenylantimon(5)chlorid wird in kaltem Aceton gelöst und eine Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure zugegeben. Es fällt sofort ein farbloser, feinkristalliner Niederschlag aus, der abgeseugt und über Natronkalk im Exsiccator getrocknet wird. Das Pyridiniumsalz zerfällt bei 265°. Die Ausbeute ist nahezu gleich der theor.

Eigenschaften:

Mit verd. Alkalien entwickelt die Verbindung Pyridin. Sie ist unlöslich in verd. Salzsäure; aus ihrer heißen Lösung in Eisessig fällt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff ein hellgelber Niederschlag aus.

Analyse:

64,75 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 5,23 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.

0,3542 g Sbft. verbrauchten nach Aufschluß 13,78 ccm n/10 J-Lsg

C₁₇H₁₆NCl₄Sb Ber. Cl 28,50; Sb 24,47;

Gef. Cl 28,64; Sb 23,69;

²⁴⁾ A. 421, 187.

20. Versuch zur Darstellung von Pyridinium-(triphenylo-trichloro-stibanat)

Triphenylantimon(5)chlorid ²⁵⁾ vom Schmelzpunkt 139° (Literatur 143°) wurde in Aceton gelöst und vorsichtig mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure versetzt. Es entstand sofort ein farbloser, kristalliner Niederschlag, der abgeseugt und über Natronkalk getrocknet wurde. Der Niederschlag war unlöslich in Wasser, verd. Alkalien und Salzsäure. Beim Erwärmen mit Alkalien wurde kein Pyridin entwickelt. Der Schmelzpunkt lag nach einmaligem Umkristallisieren bei 138—139°. Ein Mischschmelzpunkt der erhaltenen Verbindung mit dem Ausgangsmaterial zeigte keine Schmelzpunktniedrigung. Die Löslichkeit des Niederschlags war identisch mit der des Triphenylantimon(5)chlorids.

Analyse:

49,32 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 2,29 ccm

n/10 AgNO₃-Lsg.

C₁₈H₁₅Cl₂Sb Ber. Cl 16,73;

Gef. Cl 16,42;

25) Michaelis und Reece A. 233, 44. Das Präparat wurde in liebenswürdiger Weise mir von Herrn Dr. Schneider zur Verfügung gestellt.

Aromatische Arsenverbindungen.

21. p-Dimethylaminophenyl-arsinoxyd



p-Dimethylaminophenylarsinoxyd wurde erstmals von Michaelis und Rabinerson¹⁾ dargestellt und als amorphes, farbloses Pulver vom Schmelzpunkt 75° beschrieben. Später wiederholten H. Raudnitz und H. Heller²⁾ teilweise die Arbeiten von Michaelis und seinem Mitarbeiter und bezeichneten das Arsinoxyd als feinkristallines Pulver, das bei 95° schmilzt. In der nachfolgenden Beschreibung wird von mir eine abgeänderte Darstellungsweise des Arsinoxyds angegeben; es wurde im Gegensatz zu den Angaben der genannten Autoren in sehr gut ausgebildeten, farblosen Kristallen vom Schmelzpunkt 198° erhalten.

Darstellung:

20 g frisch destilliertes Dimethylanilin werden in einem Schliffkolben mit Kühler unter Feuchtigkeitsausschluß mit 50 g Arsen-trichlorid zusammengegeben. Es tritt starke Wärmeentwicklung auf. Das Reaktionsgemisch wird unter häufigem Schütteln 1 Std. lang auf dem Wasserbad erhitzt. Der noch warme, gelbe Syrup wird dann allmählich in 400 ccm kaltes Wasser unter Umrühren eingetragen und so gelöst. Geringe Mengen ungelöster arseniger Säure werden abfiltriert. Das kalte Filtrat wird mit 30%iger Natronlauge im Überschuß versetzt, bis der reichlich ausgefiedene Niederschlag sich zum größten Teil wieder gelöst hat. Das Ganze wird durch ein Faltenfilter von dem Niederschlag befreit (Tris-dimethylaminophenylarsin) und das Filtrat zur Beseitigung des überschüssigen Dimethylanilins im Scheidetrichter mehrmals ausgeäthert und zum Schluß zweckmäßig nochmals filtriert. Leitet man nun in das klare,

1) A. 270, 140.

2) B. 60, I, 743.

farblofe Filtrat Kohlendioxyd ein, so fällt nach einiger Zeit p-Dimethylaminophenylarsinoxyd als flockiger, weißer Niederschlag aus, der abgefaugt, bis zur Alkalifreiheit mit Wasser gewaschen und endlich auf Ton im Vakuum 2—3 Tage lang über Phosphorpentoxyd getrocknet wird.

Das rohe Arfinoxyd hat keinen charakteristischen Schmelzpunkt; bei 5 getrennt ausgeführten Darstellungen schwankten die Taupunkte zwischen 70—77° (im Mittel 73°) und die unscharfen Schmelzpunkte zwischen 88—93° (im Mittel 90°).

Analyse des rohen Arfinoxyds:

0,1616 g Sbft. gaben bei der Verbrennung 0,2648 g CO₂ und
0,0784 g H₂O

0,1436 g Sbft. gaben nach Aufschluß 0,1017 g Mg₂As₂O₇.

C₈H₁₀ONAs Ber. C 45,49; H 4,78; As 35,52;

Gef. C 44,69; H 5,43; As 34,19;

Eigenschaften des rohen Arfinoxyds:

Das Oxyd ist leicht löslich in verd. Säuren und starken Alkalien, dagegen unlöslich in Wasser und wässrigem Alkalikarbonat. In Chloroform, Benzol, Aceton, Eisessig, Essigsäureanhydr., warmem Tetrachlorkohlenstoff und Dioxan löst sich die Verbindung leicht; schwerer in Schwefelkohlenstoff, Methyl- und Äthylalkohol; gänzlich unlöslich ist sie in Äther und Ligroin. Beim Umkristallisieren aus Äthylalkohol, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform und Benzol werden Schmierer erhalten. Aus einer Lösung des Oxyds in Eisessig oder Essigsäureanhydr. kristallisiert nach einigen Stunden eine farblose Verbindung aus, — höchstwahrscheinlich ein Acetat. In Dioxanlösung erleidet das Arfinoxyd eine Oxydation zur p-Dimethylaminophenylarsonsäure, die nach einiger Zeit kristallin ausfällt und analysiert werden konnte. Zum Umkristallisieren des rohen p-Dimethylaminophenylarsinoxyds kommen also von den erwähnten organischen Lösungsmitteln nur Aceton und Schwefelkohlenstoff in Betracht.

Umkristallisieren aus Aceton:

Rohes p-Dimethylaminophenylarsinoxyd wird in kaltem Ace-

ton gelöst und unverzüglich abfiltriert. Nach kurzer Zeit, — beim Erwärmen augenblicklich, — fällt aus dem Filtrat ein farbloser, kristalliner Niederfchlag aus, der abgefaugt und im Vakuum über Phosphorpentoxyd getrocknet wird. Der Schmelzpunkt liegt bei 195—97°; aus heißem Benzol oder viel Aceton umkristallifiziert, schmilzt die Verbindung bei 194—196°.

Die oben erwähnten Löslichkeitseigenschaften des rohen Arfinoxyds treffen auch für das aus Aceton umkristallifizierte Oxyd zu. Wird 1 g des Arfinoxyds in 2 ccm konz. Salzfäure gelöst und die Lösung mit 1 ccm rauch. Salzfäure veretzt, so entsteht nach einiger Zeit ein farbloser Kristallbrei von p-Dimethylaminophenylarsinchlorid-hydrochlorid ³⁾



Die Kristalle schmelzen nach dem Auswaschen mit konz. Salzfäure und nach dem Trocknen im Vakuum über Ätznatron bei 115 bis 115,5° (Literatur 116°). Das Chlorid ist identisch mit dem aus dem rohen Arfinoxyd auf gleichem Wege erhaltenen Chlorid.

Die Molekulargewichtsbestimmung des umkristallifizierten Arfinoxyds, die nach Raft in Kampfer, außerdem auch in Chloroform ausgeführt wurde, erbrachte den Beweis für seinen monomolekularen Aufbau.

- 1.) 0,592 mg Sbft. in 28,666 mg Kampfer ($k=40,0^0$) ergaben eine Depreffion von 3,3°.
- 2.) 0,214 mg Sbft. in 15,880 mg Kampfer ergaben eine Drepreffion von 2,4°.
- 3.) 0,1142 g Sbft. in 27,2 g Chloroform ($K = 3,8^0$) ergaben eine Depreffion von 0,070°.

$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{ONAs}$

Ber. Molekulargewicht 211,05

Gef. Molekulargewicht 1.) 249

2.) 224

3.) 227

3) Michaelis und Rabinerson, A. 270, 142.

Analyse des aus Aceton umkristallisierten Arfinoxyds:

4,759 mg Sbft. ergaben bei der Verbrennung 8,030 mg CO_2 und 2,100 mg H_2O .

0,3227 g Sbft. gaben nach Aufschluß 0,2298 g $\text{Mg}_2\text{As}_2\text{O}_7$.

$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{ONAs}$ Ber. C 45,49; H 4,78; As 35,52.

Gef. C 46,01; H 4,94; As 34,38;

Umkristallisieren des rohen Arfinoxyds aus Schwefelkohlenstoff:

Rohes p-Dimethylaminophenylarfinoxyd wird in kaltem Schwefelkohlenstoff gelöst und filtriert. Aus dem Filtrat kristallisieren beim langsamen Eindunsten des Lösungsmittels farblose, gut ausgebildete Nadeln aus, die abgelaugt und über Phosphorpentoxyd im Vakuum getrocknet werden. Der Schmelzpunkt der Verbindung liegt bei 195—198°.

Eigenschaften:

Die oben angegebenen Löslichkeitseigenschaften des rohen wie auch des aus Aceton umkristallisierten Arfinoxyds treffen ebenfalls für das aus Schwefelkohlenstoff erhaltene Oxyd zu. Auch läßt sich das Arfinoxyd aus Schwefelkohlenstoff durch Behandeln mit konz. und rauch. Salzsäure in das bekannte p-Dimethylaminophenylarsinchlorid-hydrochlorid vom Schmelzpunkt 116—116,5° überführen. Eine Molekulargewichtsbestimmung des Oxyds nach Raft in Kampfer erwies seine Monomolekularität.

1,220 mg Sbft. in 25,428 mg Kampfer ($k=40,0^\circ$) gelöst, gaben eine Depression von 9,8°.

$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{ONAs}$ Ber. Molekulargewicht 211,05;

Gef. Molekulargewicht 195,8;

Analyse:

4,918 mg Sbft. ergaben bei der Verbrennung 8,210 mg CO_2 und 2,110 mg H_2O .

0,2274 g Sbft. gaben nach Aufschluß 0,1631 g $\text{Mg}_2\text{As}_2\text{O}_7$.

$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{ONAs}$ Ber. C 45,49; H 4,78; As 35,52;

Gef. C 45,53; H 4,80; As 34,62;

Für alle nachfolgenden Versuche wird als Ausgangsverbindung das aus Schwefelkohlenstoff umkristallifizierte p-Dimethylaminophenylarsinoxyd verwendet.

22. p-Arsenophenyl-trimethyl-ammoniumjodid.



Darstellung:

p-Dimethylaminophenylarsinoxyd wird mit der 3—4fachen Gewichtsmenge Methyljodid 3 Stunden lang unter Feuchtigkeitsschluß in einem Schliffkolben mit Rückflußkühler in der Wärme behandelt. Es bildet sich eine gelborangene, kristalline Verbindung, die nach Beendigung der Reaktion möglichst schnell abgeseugt und in einen Vakuumexsiccator über Chlorcalcium getrocknet wird, da das Methylierungsprodukt an der Luft ziemlich schnell feine orangefarbene Farbe unter Zersetzung verliert.

Eigenschaften:

Der Schmelzpunkt des frisch bereiteten Methylierungsproduktes liegt bei 139,5—140°. Die Verbindung ist in Methylalkohol mit hellgelber Farbe, in Äthylalkohol farblos, in warmem Eisessig und warmem Essigsäureanhydr. mit roter Farbe leichtlöslich; in den übrigen organischen Lösungsmitteln wie Benzol, Toluol, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Ligroin, Aceton, Äther, Dioxan und Schwefelkohlenstoff ist das methylierte Arsinoxyd unlöslich.

In Wasser und verd. Säuren löst sich die Verbindung gut; jedoch läßt sie sich nicht aus Wasser umkristallisieren. Auch ein Versuch, das Methylierungsprodukt in Äthylalkohol zu lösen und mit Äther wieder auszufällen, scheiterte, da der entstandene, flockige, farblose Niederschlag sich an der Luft augenblicklich zu roten Schmiermassen zersetzte.

Analyse:

- 1.) 0,2980 g Sbft. ergaben nach Aufschluß 0,1990 g AgJ.
- 2.) 60,40 mg Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 1,71 ccm n/10 AgNO₃-Lsg.

$C_6H_{13}ONa_5J$ Ber. J. 35,94;
Gef. J. 1.) 36,10;
2.) 35,93;

Anlagerungsverbindungen an das methylierte Produkt:

Da das mit Methyljodid erhaltene Reaktionsprodukt von unbeständiger Natur ist, so wurde versucht, stabile Anlagerungsverbindungen herzustellen.

Eine frischbereitete, wässrige Lösung des methylierten Arsin-oxyds wurde mit einer 5%igen Lösung von **Platinchlorwasserstoff-säure** $H_2(PtCl_6)$ versetzt; es fiel ein gelber Niederschlag aus, der sich sehr bald unter Braun- und Schwarzfärbung und Auscheiden von metallischem Platin zersetzte.

Wurde eine wässrige Lösung des Methylierungsproduktes mit 3%igem, wässrigem **Natriumhexachloroplateat** $Na_2(PtCl_6)$ versetzt, so entstand ebenfalls ein hellgelber Niederschlag, der sich aber unter Auscheiden von metallischem Platin nach kurzer Zeit zersetzte.

Mit **Merkurikaliumjodid** $K_2(HgJ_4)$ bildet das methylierte Arsin-oxyd eine beständige Anlagerungsverbindung von wechselnder Zusammensetzung. Zu ihrer Darstellung wird eine frisch bereitete, wässrige Lösung des Methylierungsproduktes mit einer 5%igen-wässrigen Lösung von Merkurikaliumjodid, die kein überschüssiges Jodkalium enthalten darf, versetzt. Es fällt ein schwachgelber, amorpher Niederschlag aus, der abgefaugt und über Phosphorpentoxyd 2 Tage lang getrocknet wird.

Die Anlagerungsverbindung ist in Wasser, verd. Ammoniak, verd. Essigsäure und verd. Schwefelsäure unlöslich. Verd. Alkalien lösen sie in der Kälte, zersetzen sie aber in der Wärme unter Dunkelfärbung. In den meisten organischen Lösungsmitteln ist die Verbindung unlöslich, ausgenommen in Methylalkohol und Essigsäure-anhydr. Der Schmelzpunkt ist undeutlich; bei etwa 130° erweicht die Verbindung unter beginnender Grünfärbung; bei etwa 150° hat sie sich vollständig zu einem grünen Öl zersetzt. Die Analysen von mehreren getrennt dargestellten Produkten ergaben keine einheitlichen Resultate.

Mit 70%iger **Überchlorfäure** bildet sich aus p-Arsenofophenyltrimethyl-ammoniumjodid ein neues Salz. Das methylierte Arsin-oxyd wird in wenig Wasser gelöst und in der Kälte so lange vorsichtig mit 70%iger Überchlorfäure versetzt, bis eben ein bleibender Niederschlag auftritt. Das Ganze wird im Vakuumexsiccator über Chlorcalcium der Kristallisation überlassen. Nach etwa zwei Tagen haben sich hellgelbe Kristalle abgeschieden. Die Ausbeute ist sehr gering. Die Verbindung zersetzt sich bei 106—108°. In der offenen Flamme verpufft sie (Perchlorat). Aus einer Lösung des Salzes in verd. Schwefelsäure wird mit Chlorwasser Jod in Freiheit gesetzt. Die Lösung der Verbindung in verd. Salzsäure gibt beim Einleiten von Schwefelwasserstoff keine Fällung. Ebenso scheidet eine Silbernitratlösung aus der salpetersauren Lösung des Perchlorats keinen Niederschlag von Jodsilber aus, im Gegensatz zu dem Verhalten der Ausgangsverbindung.

23. Versuch zur Darstellung eines Chlorosalzes des p-Dimethylaminophenylarsin(3)chlorids.

p-Dimethylaminophenylarsin-oxyd bzw. p-Dimethylaminophenylarsinchlorid-hydrochlorid⁴⁾ wurde in Eisessig gelöst. Zu der Lösung wurde wenig rauch. Salzsäure gegeben und das Ganze mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzsäure versetzt. Auch bei der Anwendung eines Überschusses an saurem Pyridin trat keine Veränderung in der Lösung auf. Nach einigen Tagen bildeten sich im Exsiccator über Natronkalk farblose Kristalle vom Schmelzpunkt 113—114°. Die Verbindung entwickelte mit verd. Alkalien kein Pyridin; es lag also kein Pyridiniumsalz vor. Vielmehr bewies ein Mischschmelzpunkt des erhaltenen Produktes mit Arsinchlorid, daß p-Dimethylaminophenylarsinchlorid-hydrochlorid zurückerhalten worden war.

24. Tris-(p-dimethylaminophenyl)-arsinperchlorat.



Als Ausgangsverbindung zur Darstellung des Perchlorats kann

4) Michaelis und Rabinerson A. 270, 142.

das tertiäre Arsin **Tris-(p-dimethylaminophenyl)arsin** ⁵⁾ dienen, das als Nebenprodukt bei der Darstellung des p-Dimethylaminophenylarsinoxyds anfällt. In Ergänzung zu den Literaturangaben sei erwähnt, daß die Bildung von tertiärem Arsin von der Dauer der in der Wärme durchgeführten Kondensation von Arsentrichlorid mit Dimethylanilin abhängig ist. Im Gegensatz zu den Angaben von Michaelis und Rabinerson ⁶⁾ steigt die Ausbeute an tertiärem Arsin mit der Kondensationsdauer. Zur Isolierung der Verbindung wird das in Wasser gelöste Reaktionsprodukt filtriert und das Filtrat mit einem Überschuß von 30%iger Natronlauge versetzt. Das tertiäre Arsin bleibt als harziger Rückstand zurück, der abfiltriert und auf Ton an der Luft getrocknet wird. Das harzige Produkt wird mit Chloroform im Soxhlet ausgezogen. Aus der extrahierten Lösung fällt auf Zusatz von Äthylalkohol das tertiäre Arsin aus; man kristallisiert es mehrmals aus heißem Äthylalkohol um. Der Schmelzpunkt liegt bei 240°.

Anal y se:

0,2600 g Sbft. ergaben bei der Verbrennung 0,6353 g CO₂ und 0,1661 g H₂O.

0,1387 g Sbft. gaben nach Aufschluß 0,0488 g Mg₂As₂O₇.

C₂₄H₃₀N₃As Ber. C 66,21; H 6,95; As 17,22;

Gef. C 66,64; H 7,15; As 16,98;

Perchlorat:

Das Perchlorat läßt sich auf 2 verschiedenen Wegen darstellen. Einmal diene als Ausgangsverbindung das oben beschriebene tertiäre Arsin, ein anderes Mal das primäre Arsinoxyd bzw. sein Chlorid.

1. Darstellung:

Das tertiäre Arsin wird tropfenweise solange mit 70%iger Überchlorsäure versetzt, bis sich eben alles gelöst hat. Nach einigen Stunden kristallisieren aus der Lösung farblose, gut ausgebildete Rhomboeder. Unter besonders günstigen Bedingungen tritt das

5) Michaelis und Rabinerson A. 270, 145 und H. Raudnitz und H. Heller B. 60, I. 747.

6) A. 270, 145 und H. Raudnitz und H. Heller B. 60, I. 747.

Perchlorat bei längerem Reiben mit einem Glasstab plötzlich als farbloser Kristallbrei auf.

Eigenschaften:

Das Perchlorat zersetzt sich bei 218—220°. Es ist leichtlöslich in Wasser; durch viel Wasser oder wässrige Soda wird es zum tertiären Arsin hydrolysiert, das als flockiger, farbloser Niederschlag ausfällt und bei 238° schmilzt; ein Mischschmelzpunkt der hydrolysierten Verbindung mit dem tertiären Arsin ergab keine Depression. Das Perchlorat verpufft in der offenen Flamme sehr heftig.

Analyse:

13,512 mg Sbft. gaben bei der Verbrennung 0,565 ccm N₂ (20°; 766 mm)

0,1248 g Sbft. verbrauchten nach Aufschluß 2,98 ccm n/10 Jodlsg.

$C_{24}H_{30}N_3As + 4 HClO_4$ Ber. N 5,02; As 8,96;

Gef. N 4,91; As 8,95;

2. Darstellung:


p-Dimethylaminophenylarsinoxyd oder dessen Chlorid wird auf einem Uhrglas solange tropfenweise mit 70%iger Überchlorsäure versetzt, bis eben alles Arsinoxyd bzw. Chlorid in Lösung gegangen ist. Nach einigen Stunden bilden sich farblose Kristalle. Man kann deutlich Rhomboeder und regul. Oktaeder unterscheiden. Wird zuviel Überchlorsäure angewandt, so treten nur die Oktaederkristalle auf. Die beiden Kristallformen lassen sich leicht mechanisch von einander trennen. Sie werden zwischen gehärtetem Filtrierpapier und dann über Natronkalk im Exsiccator getrocknet.

Die **regul. Oktaeder** sind nichts anderes als **Arsentrioxyd**. Aus einer salzr. Lösung der Kristalle fällt Schwefelwasserstoff gelbes Arsentrisulfid. In der offenen Flamme verpufft die Verbindung nicht, im Gegensatz zu dem Perchlorat. Auch die Stickstoffprobe nach Lasseigne verläuft negativ. Ein Überschuß an Überchlorsäure wirkt höchstwahrscheinlich spaltend auf das Arsinoxyd ein:



denn im Filtrat der abgefaugten Kristalle ist deutlich Dimethylanilin beim Verzetzen mit verd. Alkalien nachweisbar.

Die **Rhomboeder** erwiesen sich als das gesuchte **Perchlorat**. Das Salz verpuffte heftig in der offenen Flamme. Es sinterte bei etwa 110° zusammen, erweichte bei 120—130° und erstarrte dann wieder bei etwa 150°; bei etwa 200° begann es sich langsam dunkel zu färben und schmolz bei 218—220° unter plötzlicher Zersetzung. Durch eine wäßrige Lösung wurde das Perchlorat zu einem flockigen, farblosen Niederschlag hydrolysiert, der sich nach dem Abfugen und Trocknen über Chlorcalcium als tertiäres Arsin erwies (Schmelzpunkt 238°). Ein Mischschmelzpunkt des Hydrolyseproduktes mit tertiärem Arsin ergab keine Depression. Wir müssen folgenden Reaktionsverlauf annehmen:



A n a l y s e :

4,800 mg Sbft. gaben bei der Verbrennung 0,210 ccm N₂ (21,5°; 765 mm)

0,1357 g Sbft. verbrauchten nach Aufschluß 3,13 ccm n/10 J-Lsg.

C₂₄H₃₀N₃As · 4 HClO₄

Ber. N 5,02; As 8,96;

Gef. N 5,01; As 8,65;

25. Versuch zur Darstellung eines Chlorofalzes des p-Aminophenylarsen(5)chlorids.

p-Aminophenylarsensäure wurde in heißer, konz. Salzsäure gelöst und die Lösung mit einer salzsr. Pyridinlösung versetzt. Es entstand ein farbloser, kristalliner Niederschlag, der abgeseigt und über Natronkalk getrocknet wurde.

Verd. Alkalien entwickelten aus dem Salz erst beim Erhitzen Spuren von Pyridin (Verunreinigung). Aus einer heißen, salzsr. Lösung der Verbindung fällt Schwefelwasserstoff einen farblosen Niederschlag von aromatischem Arsenulfid. Es lag das Hydrochlorid der Arsanilssäure



vom Schmelzpunkt 260° vor; ein Chlorofalz war nicht entstanden.

A n a l y s e:

0,1645 g Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 6,74 ccm
n/10 AgNO_3 -Lsg.

$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_3\text{NClAs}$ Ber. Cl 13,99;

Gef. Cl 14,52;

Zum Vergleich wurde das bekannte Arsanilfsäure-hydrochlorid⁷⁾ nach einer einfachen, in der Literatur nicht erwähnten Methode dargestellt: Arsanilfsäure wurde in heißer, konz. Salzsäure gelöst. Aus der Lösung kristallisierte beim Erkalten das Hydrochlorid aus, das über Natronkalk (ohne Vakuum!) getrocknet wurde. Der Schmelzpunkt lag bei $265\text{—}267^\circ$.

A n a l y s e:

0,1005 g Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 4,02 ccm
n/10 AgNO_3 -Lsg.

$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_3\text{NClAs}$ Ber. Cl 13,99;

Gef. Cl 14,18;

Der Mischschmelzpunkt beider Verbindungen lag bei $260\text{—}263^\circ$.

26. Versuch zur Darstellung eines Chlorofalzes des Phenylarfen(5)chlorids

Als Ausgangsverbindung diente die nach der Vorschrift von H. Schmidt⁸⁾ dargestellte und nach der Methode von H. Bart⁹⁾ gereinigte Phenylarfonfsäure.

Die in verd. Salzs. gelöste Phenylarfonfsäure wurde mit einer Lösung von 20 Tropfen Pyridin in 10 ccm rauch. Salzs. versetzt. Es fiel ein farbloser, kristalliner Niederschlag aus, der auf Ton abgepreßt und über Natronkalk zwei Tage lang getrocknet wurde. Der Schmelzpunkt lag über 285° . Mit verd. Alkalien entwickelte

7) P. Ehrlich und A. Bertheim B. 40, III, 3295. J. Prat C. 1933, II, 1513.

8) A. 421, 168.

9) A. 429, 55—103.

die Verbindung kein Pyridin. Es wurde statt des gefuchten Pyridiniumfalzes Phenylarsonfäure-hydrochlorid $C_6H_5 \cdot AsO_3H_2 \cdot HCl$ ¹⁰⁾ erhalten.

Anal y se:

0,1876 g Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 7,78 ccm $n/10$ $AgNO_3$ -Lsg.

$C_6H_5O_3ClAs$ Ber. Cl 14,87;

Gef. Cl 14,71;

Im Gegensatz zu den Angaben von Prat ¹¹⁾ ist das Hydrochlorid beständig. Es kristallisiert aus einer verd. falzsr. Lösung der Phenylarsonfäure über Natronkalk im Exsiccator nach einiger Zeit aus. Bei der Analyse des so dargestellten Produktes verbrauchten 0,2820 g Sbft. bei der elektrometr. Titration 11,50 ccm $n/10$

$AgNO_3$ -Lsg.

$C_6H_5O_3ClAs$ Ber. Cl 14,87;

Gef. Cl 14,46;

27. Versuch zur Darstellung eines Chlorofalzes des Triphenylarsins.

Das nach dem Verfahren von P. Pfeiffer und Pietrich ¹²⁾ dargestellte Triphenylarsin ¹³⁾ vom Schmelzpunkt 59^0 wurde in Aceton gelöst und die Lösung allmählich mit einer falzsr. Lösung von Pyridin versetzt. Es entstand eine farblose Emulsion, aus der sich bei Kühlfranktemperatur (-7^0) nach einiger Zeit ein farbloser, kristalliner Niederschlag absetzte. Die Kristalle wurden abgelaugt und über Natronkalk getrocknet.

Der Schmelzpunkt lag bei $58-59^0$. Ein Mischschmelzpunkt mit der Ausgangsverbindung zeigte keine Depression. Auch entwickelte verd. Alkali aus der Verbindung kein Pyridin. Ein Pyridiniumfalz konnte also nicht erhalten werden.

10) J. Prat, Bull. Soc. Chim. France, 53, 1475.

11) Compt. rend. Acad. Sciences 195, 489-91.

12) B. 37, 4621.

13) Diese Verbindung wurde mir lebenswürdigerweise von Herrn Dr. Schneider überlassen.

28. Versuch zur Darstellung eines Chlorofalzes des α -Naphthylarsin(3)chlorides

Als Ausgangsverbindung wurde das bekannte α -Naphthylarsin(3)chlorid ¹⁴⁾ verwandt, das aus α -Bromnaphthalin über die Zwischenstufe α -Naphthylquecksilber(2)chlorid durch Umsatz mit Arsentrichlorid ¹⁵⁾ unter teilweiser Verwendung einer Vorschrift von F. A. Blicke und F. D. Smith ¹⁶⁾ dargestellt wurde. Der Schmelzpunkt des α -Naphthylarsin(3)chlorids lag bei 70—72°.

Zur Darstellung eines Chlorofalzes wurde das Arsinchlorid in mit Chlorwasserstoff gesättigtem Äthylalkohol gelöst und zu der Lösung eine falzsr. Pyridinlösung gegeben. Nach zwei Tagen kristallisierte über Natronkalk im Exsiccator eine farblose Verbindung vom Schmelzpunkt 68—69° aus. Ein Mischschmelzpunkt der Kristalle mit der Ausgangsverbindung lag bei 69—70°. Es war also kein Pyridiniumfalz entstanden, zumal mit verd. Alkalien kein Pyridin entwickelt wurde.

29. p-Phenylenarsonsäure von Hans Schmidt.

H. Schmidt und Fr. Hoffmann ¹⁷⁾ erhielten aus diazotierter Arsanilfsäure durch anschließende Reduktion das Diazoniumfalz:




Dieses wurde mit einer wässrigen Lösung von Natriumbicarbonat zu einer sehr beständigen Verbindung der Summenformel $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_3\text{As}$ zersetzt. Die genannten Autoren gaben der Verbindung die Formel einer hydratischen p-Phenylenmonoarsonfsäure:

14) Michaelis A. 320, 342. W. Steinkopf und W. Mieg, B. 53, I, 1015.


15) Matsumija, C. 1926, I, 652; Memoirs of the College of Science Kyoto, Imp. Univ. Serie A. 8, 1925, Sept.

16) J. Amer. Chem. Soc. 51, II, 3480.

17) B. 59, I, 562—63.




indem sie eine innere Kupplung am Benzolkern annahmen. Bei der Reduktion der Arsonsäure in konz. Lösung wurde ein Chlorid gefaßt, von der Zusammensetzung $\text{C}_6\text{H}_4\text{AsCl}$, dem die Formel



zugeschrieben wurde.

Die wenig wahrscheinliche Formulierung der Verbindung $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_3\text{As}$ durch H. Schmidt und seinem Mitarbeiter war schon vor einiger Zeit Gegenstand einer vorläufigen Untersuchung von P. Pfeiffer und Breith. Die durch den Abgang von Herrn Dr. Breith unterbrochene Untersuchung wurde von mir fortgeführt.

a.) Diazotiertes p-Aminophenylarson(3)chlorid:



p-Aminophenylarsonsäure wurde nach der Vorschrift von H. Schmidt und Fr. Hoffmann diazotiert und mit schwefliger Säure reduziert. Die Verbindung kristallisierte in goldgelben Nadeln vom Schmelzpunkt $112-114^\circ$ (in der Literatur 100°) aus. Sie war in allen organischen Lösungsmitteln unlöslich. Im Gegensatz zu den Literaturangaben löste sie sich leicht in Wasser, jedoch trat nach einiger Zeit ein farbloser, flockiger Niederschlag in Folge von Hydrolyse auf. Das gleiche Verhalten zeigte die Verbindung beim Lösen in verd. Salzsäure. Verd. Alkalien zersetzten das Diazonium-

salz unter Stickstoffentwicklung; dabei entstand eine orangene, klare Lösung.

Analysis:

0,2117 g Sbft. verbrauchten bei der elektrometr. Titration 22,21 ccm n/10 AgNO₃Lsg.

C₆H₄N₂Cl₃As Ber. Cl 37,27;
Gef. Cl 37,21;

b.) Die H. Schmidt'sche Arsonsäure



Das Diazoniumsalz wurde nach der Vorschrift von H. Schmidt und seinem Mitarbeiter in wässriger Lösung von Natriumcarbonat in der Kälte zersetzt. Eine heftige Stickstoffentwicklung konnte nicht beobachtet werden. Die Färbung der Lösung ging mit fortschreitender Zersetzung von Gelb in Rot über. Nach 4 Std. war die Zersetzung beendet. Das Ganze wurde filtriert und das Filtrat mit verd. Salzsäure versetzt. Es fiel ein hellbraunes Pulver aus, das abgeseigt und über Chlorcalcium getrocknet wurde. Die Verbindung enthielt noch 0,74% Stickstoff (61,956 mg Sbft. ergaben bei der Verbrennung 0,396 ccm N bei 21° und 757,0 mm).

Zur Reinigung wurde die Verbindung im Mörser mit Wasser verrieben und das Ganze mit Wasser zweimal ausgekocht und filtriert. Die Farbe der Substanz änderte sich hierbei nicht. Sie enthielt noch 0,44% Stickstoff (15,860 mg Sbft. ergaben bei der Verbrennung 0,060 ccm N bei 20° und 763,0 mm). Da alle normalen Reinigungsversuche verfielen, wurde die Verbindung schließlich mit rauch. Salpetersäure im Verhältnis 1 g Sbft. auf 8 ccm Salpetersäure eine Stunde lang auf dem Wasserbad erwärmt. Es entstand eine klare Lösung, die in viel kaltes Wasser eingetragen wurde, wobei sofort ein farbloser, flockiger Niederschlag auftrat, der abgeseigt und über Phosphorpentoxyd getrocknet wurde. Die Verbindung enthielt jetzt nur noch 0,25% Stickstoff (18,826 mg Sbft. ergaben bei der Verbrennung 0,040 ccm N bei 21° und 763,0 mm). Unter

den angegebenen Bedingungen fand also keine Nitrierung statt; vielmehr wurde die Verbindung auf diesem Wege in recht reiner Form erhalten.

Löslichkeit:

Die Verbindung war in allen organischen Lösungsmitteln unlöslich, ebenso in allen verd. anorganischen Säuren. In warmer konz. Schwefelsäure und kalter rauch. Salpetersäure war sie leicht löslich; durch Eingießen der Lösungen in Wasser wurde die ursprüngliche Substanz wieder zurückerhalten. In verd. Alkalien, z. B. in verd. Ammoniak, löste sich die Verbindung mit gelber Farbe; es trat schwache, grüne Fluorescenz auf.

Anal y s e (der bei 80° im Vakuum getrockneten Substanz):


- 1.) 4,842 mg Sbft. verbrannt, ergaben 6,680 mg CO₂ und 1,410 mg H₂O.
- 2.) 4,990 mg Sbft. verbrannt, ergaben 6,870 mg CO₂ und 1,390 mg H₂O. ¹⁸⁾

Ber. für C ₆ H ₅ O ₂ As	C 39,13%	H 2,74%
C ₁₂ H ₁₂ O ₅ As ₂	C 37,30%	H 3,14%
Gef.	1.) C 37,63%	H 3,26%
	2.) C 37,55%	H 3,12% ¹⁸⁾

Atomverhältnis:

$$C : H = 1 : 1,01$$

Nach diesen Analysendaten kommt der H. Schmidt'schen Säure nicht die aufgestellte Formel C₆H₅O₂As zu; die Analysen stimmen aber ausgezeichnet auf die Formel C₁₂H₁₂O₅As₂, die folgendermaßen aufgelöst werden kann:



c.) Nitrierungsversuch:

Eine Nitrierung der Verbindung erfolgte auch nach mehrstündigem Behandeln mit rauch. Salpetersäure auf dem Wasserbade nicht. Sie wurde daher drei Stunden lang in der Kälte mit Nitrier-

¹⁸⁾ Diese Analyse rührt von einer Substanz her, die von Herrn Dr. Breith ein Jahr vorher hergestellt worden war.

fäure (1 Tl. konz. Schwefelfäure und 1 Tl. rauch. Salpeterfäure) behandelt. Die schwachgelbe Lösung wurde in Wasser eingetragen, wobei aber die Ausgangsverbindung wieder als farbloser, flockiger Niederschlag ausfiel, der bei der Prüfung nach Lasseigne nur Spuren von Stickstoff zeigte.

Schließlich wurde die Verbindung drei Stunden lang mit Nitrierfäure auf dem siedenden Wasserbad behandelt. Die Lösung wurde in Wasser gegossen und der entstandene, farblose Niederschlag abgeseugt und gut mit Wasser ausgewaschen. Die Verbindung wurde über Natronkalk getrocknet.

A n a l y s e :

12,600 mg Sbft. ergaben bei der Verbrennung 0,168 ccm N (20,0°; 755,0 mm).

$C_{12}H_{11}O_7Na_5$ Ber. N 3,25;
Gef. N 1,55;

Es war also nur geringfügige Nitrierung erfolgt.

d.) S u l f i d d e r H. S c h m i d t ' s c h e n S ä u r e :

Die Verbindung wurde in verd. Ammoniak gelöst und die Lösung mit Tierkohle geschüttelt. Nach einiger Zeit wurde die Lösung filtriert und in das Filtrat bis zur Sättigung Schwefelwasserstoff eingeleitet. Es fiel kein Niederschlag aus. Erst beim Neutralisieren der Reaktionslösung mit verd. Salzfäure trat ein schwach gelb gefärbter, flockiger Niederschlag auf, der abgeseugt und gut mit Wasser ausgewaschen wurde. Die Verbindung wurde über Calciumchlorid im Exsiccator getrocknet und dann mit Schwefelkohlenstoff im Soxhlett zwei Stunden lang von überschüssigem Schwefel befreit. Es blieb nach dem Trocknen ein hellbraunes Pulver zurück.

A n a l y s e (der über Calciumchlorid im Exsiccator ohne Vakuum getrockneten Substanz):

1.) 0,2064 g Subst. gaben nach 8-stündigem Aufschluß bei 300° mit rauch. Salpeterfäure im Bombenrohr 0,3234 g $BaSO_4$.

2.) 13,902 mg Sbft. gaben 21,160 mg $BaSO_4$.

3) 4,579 mg Sbft. ergaben bei der Verbrennung 5,820 mg CO_2
und 1,020 mg H_2O .

Gefunden:	1.)	—	—	S	21,52
	2.)	—	—	S	20,91
	3.)	C	34,66	H	2,49
					—

Das Atomverhältnis ist also:

$$\text{C} : \text{H} : \text{S} = 6 : 5,13 : 1,37.$$

Daraus folgt, daß nur ein partieller Ersatz von Sauerstoff durch Schwefel statt gefunden hat.

Lebenslauf.

Am 17. 6. 1906 wurde ich, P a u l S c h m i d t, Sohn des Oberstudiendirektors Dr. Gotthard Schmidt und seiner Ehefrau Gertrud geb. Dreefen, zu Düsseldorf geboren. Ich bin arischer Abstammung.

Nach Absolvierung der dreijährigen Vorschule habe ich die Oberrealschule Düsseldorf-Grafenberg von Ostern 1916 bis November 1918 besucht. Infolge Verletzung meines Vaters nach Ahlen in Westf. besuchte ich das dortige Städt. Realgymnasium von November 1918 bis Februar 1923, ab Februar 1923 das Städt. Realgymnasium zu Bonn, wo ich Ostern 1926 meine Reifeprüfung bestand. Sommer-Semester 1926 belegte ich an der Universität Bonn Naturwissenschaften (Mathematik, Physik und Chemie). Im Wintersemester 1929/30 wechselte ich mein Studium und studierte ausschließlich Chemie. April 1931 bestand ich das 1. Chem. Verbandsexamen, Februar 1933 das 2. Chem. Verbandsexamen. Im April 1933 begann ich unter Leitung von Herrn Prof. Dr.ing. E. h. Paul Pfeiffer vorliegende Doktorarbeit, deren praktischen Teil ich im Sommer-Semester 1935 abschloß.

Seit November 1933 bin ich in der anorganischen Abteilung des Chemischen Instituts der Universität Bonn als Hilfsassistent tätig.

Tag der mündlichen Prüfung: 29. Oktober 1935.
